

Tragopogon Linn. gen. 905. Endl. gen. n. 2995.

T. hirsutum Gou. fl. monsp. 342. D. C. Prod. VII. p. 113. n. 8. Garid aix 466. t. 106. D. C. fl. fr. n. 2990. *Geopogon hirsutum* Linn. sp. 1109. Smith Prod. fl. gr. II. 119. n. 1867. Sibth. fl. gr. t. 778.

In Cypern nach Sibth.
Frankreich.

T. australe Jord. Cat. du Jardin de Dijon 1848. p. 32. Walp. Ann. II. p. 960. n. 1.

Auf der Spitze des Troodos an der Nordseite. n. 776.

T. eriospermum Ten. fl. neap. Prod. III. p. 11. D. C. Prod. VII. p. 113. n. 5.

In Cypern allgemein verbreitet, vom Seeufer bis nach Prodromo hinauf.

Neapel.

Scorzonera D. C. fl. fr. ed. 3. p. 59. Endl. gen. n. 2997.

S. araneosa Sibth. fl. gr. t. 785. D. C. Prod. VII. p. 117. n. 4. Smith Prod. fl. gr. II. p. 183. n. 1880.

In Cypern nach Sibth.
Im Orient, Olivier.

S. Cypria Kotschy sp. n. Radice tuberosa crassa multipiti, squamis fuscis foliorum vestitorum vestigiis coronata, foliis fere omnibus radicalibus lanceolatis vel lineari-lanceolatis in petiolum tenuem attenuatis, acutis, subtus et inferne tenuiter et adpresse araneoso-pubescentibus, scapis tenuibus simplicibus inferne 2—3 foliatis apice monocephalo folia superantibus, involucri cylindracei basi puberuli squamis lanceolatis acutis, ligulis flavis extus subrubellis. — Affinis *S. humili*, differt radice crassiori reliquisque foliorum vestitorum vestita, foliis basi angustissime attenuatis capitulis angustioribus et aliis notis. *S. parviflora* Jacq. foliis longioribus caule fistuloso crassiori etc. differt.

Auf Anhöhen um Larnaca selten, April 1859. n. 459.
Ist Cypern eigen.