

UROSPERMUM (*Scop. Introd. No. 366*).

U. DALECHAMPII (*L.*, sub *Tragopogone*; *Desf. Cat. H. Par. 90*; *DC. Pr. vii. 116*).

Mar. sept.—Inter Tanger et Tetuan (*J. D. H.*)! Vidi etiam in collibus pr. Tanger!

Ar. Geog. Regio Mediterranea occidentalis (exclusa Macaronesia).

Fertur in Thracia et in insulis Archipelagi, sed a recentioribus non visum.

U. PICROIDES (*L.*, sub *Tragopogone*; *Desf. Cat. H. Par. 90*; *DC. Pr. vii. 116*).

Mar. sept.—Tanger (*Webb Herb.*)! Cap. Spartel! Tetuan!

Mar. occid.—Casa Blanca! Mazagan! Djebel Hadid haud procul Mogador (*R. et Fr. spec. in Herb. Kew.*)!

Mar. merid.—Prov. Shedma!

Ar. Geog. Regio omnis Mediterranea (inclusa Macaronesia).

SCORZONERA (*L. Gen. 906*).

S. UNDULATA (*Vahl, Symb. ii. 86*; *DC. Pr. vii. 117*).

Mar. sept.—Tanger (*Salzm. Exsicc.*)! Tetuan (*Webb Herb.*)!

Mar. merid.—Ad radices Atlantis Majoris. Mesfioua! Ourika! Tasse-remout! In convalle Aït Mesan!

Ar. Geog. Africa boreali-occidentalis. Fertur in Oriente, sed monente cel. Boissier planta orientalis ad speciem diversam, *S. Alexandrinam* suam, referenda est.

S. DELICIOSA (*Guss. Ind. Sem. H. Bocc. 1825*; *DC. Pr. vii. 118*), var.

TETUANENSIS, = *S. Tetuanensis* (*Webb MSS. in Herb.*).

Mar. sept.—In regione collina inter Tanger et Tetuan! Prope Tetuan! (*Webb Herb.*)!

Planta Tetuanensis differt a typo Siculo foliis et involucri foliolis plures (sæpe ter) latioribus. Specimina Algeriensia *S. deliciosa* tamen intermedia sunt; et in hoc genere folia latitudine valde variabilia. Achenia matura non vidi.

Ar. Geog. *S. deliciosa* nonnisi in Sicilia et in Africa boreali-occidentali hucusque detecta fuit.

S. PYGMÆA (*Sibth. et Sm. Fl. Gr. viii. 61, tab. 783*; *DC. Pr. vii. 123*).

Mar. merid.—In regione alpina Atlantis Majoris, in jugo Tagherot legi spec. nondum florentia quæ mihi incertæ sedis manebant donec cel. Cosson certum me fecit hæc ad *S. pygmæum*, *S. S.*, referenda esse, et spec. florentia, mense Junio 1874 in monte Djebel Ouensa ab indigeno Ibrahim lecta, benev. communicavit!

Ar. Geog. Distributio hujus sp. anomala est. Olim in monte Olympo Bithynico, nec alibi in Oriente, detecta, postea in summis cacuminibus Atlantis Minoris Algeriae (Djebel Chelliah, Djebel Tougour) reperta, et demum in Atlante Majore.