

PAPPUS SESSILIS PLUMOSUS.

SCORZONERA. *Tournef. Tab. 269. Linnaei. Gaertner. 2. p. 367. Tab. 159.*

Flores hermaphroditi. Calyx oblongus laciniis acutis margine membranaceis. Pericarpia longa sursum {attenuata. Pappus seraceus et paleaceus mixtus.

edulis, caule ramoso: foliis amplexicaulibus integris serrulatis. *Scorzónera hispanica. Linn. Icon. Blakwell. Tab. 406.*

colitur. Biennis.

laciniata L., caule ramoso folioso: foliis lanceolatis: imis pinnatifidis: caulinis dentatis acutis.

h. H. Biennis.

PAPPUS STIPITATUS PILOSUS.

LACTUCA. *Tournef. Tab. 267. Linnaei gen. n. 1234. Gaertner. 2. p. 361. Tab. 158.*

Flores hermaphroditi. Calyx cylindricus: foliolis margine membranaceis arcte adpressis. Pericarpia ovata compressa utrinque attenuata striata.

scariola L., foliis verticalibus: nervo albido et margine aculeatis.

Variat. α . foliis runcinatis pinnatifidis.

Lactuca sylvestris italica costa spinosa maculis sanguineis adsperfa. *Herm. par. p. 190. icon. p. 191.*

β . foliis integris omnibus nervo aculeato: nec summis levibus: supremis auriculatis: auriculis subhastatis.

Lactuca sylvestris annua costa spinosa: folio integro colore caesio. *Morison. III. p. 58.*

h. α . H. β . spontanea ad Amoeneburgum. Annua.