

*Caulis* circiter pedalis tomento albo vago pubescens, sicut foliorum pagina inferior et pedunculi cum calyce. *Folia* radicalia et ima caulina lato-lanceolata in petiolum attenuata plana nervosa margine scabra, superiora sessilia stricta angusta: acumine longissimo. *Flos* terminalis et nonnulli laterales ex foliorum superiorum axillis: *pedunculis* calyce longioribus. *Calyx* oblongus; minus tamen quam *Sc. hispanicae*. *Corollulae* luteae. *Differt* ab affini *Sc. hispanica* pube insigniore imprimis pedunculorum et calycum, *foliis* radicalibus latis integerrimis: caulinis minutis, *ramis* praeter pedunculos laterales nullis et *calyce* breviori.

## 1569. SCORZONERA villosa.

*Sc. foliis* linearibus carinatis villosis, caule ramofo. *Linn. ed. Willd. 3. p. 1504.*

*Sc. tota villosa*, caule ramofo striato, foliis carinatis integerrimis, semiflosculis flavis: extimis subtus rubellis. *Scop. carn. ed. 2. n. 952. t. 46.*

*Sc. orientalis angustifolia*, femine longo aspera. *Tournef. cor. p. 36.*

Occurrit in Tauriae collibus aridis, circa Karassubakar et in campestribus ad fluvium Terek, circa oppidum Mosdok. Floret Majo, Junio. 2

*Squamae* exaridae albidae, caulis basin foliaque radicalia cingentes. *Caulis* circiter pedalis ramofo. *Folia* lineari-subulata longa canaliculata carinata juniora imprimis villosa, sicut tota planta; inferiora conferta. *Pedunculi* axillares terminalesque demum longissimi striati. *Flores* magnitudine et formâ *Sc. hispanicae*. *Calyces* lanuginoso-villoso fructiferi caluescentes. *Corollulae* luteae extimae subtus purpurascentes. *Antherae* atrae. *Semina* spinulis sursum spectantibus aspera, caeterum nuda.

## 1570. SCORZONERA ensifolia.

*Sc. caule folioso multifloro erecto, foliis ensiformibus nervosis filiformi-acuminatis, calycibus feminibusque lanuginosis.*

Habitat in arenâ mobili deserti Caucasico - caspii et ad Wolgam inferiorem circa coloniam Sareptanam. Floret Majo, Junio. 2

*Statura* praecedentis. *Caulis* erectus basi lanuginosus totus foliosus. *Folia* ensiformia amplexicaulia nervosa glabrescens: acumine longissimo diuarcato. *Flores* terminales et nonnulli laterales ex summorum foliorum axillis: *pedunculis* foliosis. *Calyx* squamis mucronatis, totus lanâ densâ subrusâ obtectus. *Corollulae* luteae. *Semina* ovato-oblonga brevia sicut calyx lanuginosa: *pappo* plumoso subrufo.

1571. SCORZONERA *eriosperma*.

Sc: caule folioso multifloro ascendente, foliis lineari-subulatis carinatis basi lanatis, calyce subuloso, feminibus lanâ candidissimâ vestitis.

Sc. foliis linearibus acuminatis carinatis basi lanatis; caule ramoso, calycibus incanis, feminibus tomentosis. *Linn. ed. Willd. 3. p. 1504. Marsch. casp. p. 192. app. n. 61.*

Habitat in graminosis apricis Caucasi; circa thermas constantinmontanas frequens. Floret aestate. 2

1572. SCORZONERA *purpurea*.

Sc. foliis lineari-subulatis canaliculato-triquetris, caule ramoso. *Linn. ed. Willd. 3. p. 1502. Jacq. austr. 1. p. 23. t. 35. Gmel fib. 2. p. 7. n. 5. t. 2.*

Sc. angustifolia elatior pannonica. *Clus. hist. 2. p. 139.*

In campestribus Caucaso adjacentibus, inter fluuios Kuban et Tanain reperitur. Floret Majo. 2

1573. SCORZONERA *tuberosa*.

Sc. caule unifloro folioso, foliis linearibus subtus pubescentibus, radice tuberosâ. *Linn. ed. Willd. 3. p. 1501. Pall. t. 3. app. n. 131. t. Y. f. 3.*