

95. *Astragalus onobrychioides*.

A. (caulescens erectus) pubescens, foliis petiolatis, foliolis ellipticis, spicis subcapitatis longissime pedunculatis, calicinis dentibus bracteis-que acuminatis, vexillo elongato, leguminibus oblongis erectis.

*Astragalus orientalis canescens*, capitulos Trifolii bituminosi, flore dilute purpureo. Tournef. Corr. p. 28.

In collibus lapidosis non infrequens, imprimis circa Kurt-Bulak. Floret Majo, Junio: 2.

96. *Astragalus sanguinolentus*.

A. (scapo nudo, absque caule folioso) pubescens, scapis foliis longioribus declinatis paucifloris, foliolis ellipticis supra glabris, leguminibus erectiusculis oblongis arcuatis compressis.

Lectus in montium altiorum apricis hinc inde. Floret Majo, Junio. 2.

97. *Medicago glutinosa*.

M. pedunculis racemosis, leguminibus reniformi-contortis calicibus-que villosis-viscidis, caulibus suberectis pubescentibus.

Occurrit in montium graminosis laetioribus, nec in lapidosis plane exulat. Floret Iunio, Med: sativae proxima. 2

98. *Scorzonera Eriosperma*.

S. Foliis lineari-subulatis canaliculatis caulique basi sublunatis, seminibus tomento candidissimo vestitis.

*Scorzonera critica angustifolia*, semine tomento candidissimo. Tournef. Corr. 36.

In graminosis montium, nec non in arenosis maris Caspici circa Tarki et Derbentum obvia. Floret Iunio. 2

99. *Carduus lappaceus*.

C. (foliis sessilibus) foliis bifariam pennatifidis spinosis, supra hispidis subtus tomentosis, calicibus sessilibus foliosis, squamis acuminatissimis inermibus reflexo-uncinatis.