

Hab. circā Erzeroum cl. Huet du Pavillon.

SCORZONERA GAGEOIDES Boiss. (Sect. *Lasiospora*.)

S. tota densē et crispē albo-villosa, rhizomate tenui nudo (repenti?), caulis tenuibus erectis infernē nudis suprā medium foliosis racemoso-subcorymbosis, foliis radicalibus paucis lanceo-lato-linearibus cauli subæquilongis plurinerviis infernē angustatis supernē longē attenuato-acuminatis, caulinis ad peduncularum ortum angustissimē linearibus capitula superiora superantibus, pedunculis lateralibus sub anthesi abbreviatis terminali elongato, capitulis minutis, involucri lanati phyllis lanceolatis acutis inferioribus paulò brevioribus, flosculis luteis involucrum paulò superantibus, acheniis junioribus hirsutis...

Hab. in ditione Beloutschistan cl. Stocks.

Caules tenues 6–8 pollicares in racemum 2–3 pollicarem 4–6 cephalum abeentes. Folia radicalia semipedalia medium versus 3–4 lineas lata ut et caules valdē lanata. Folia caulina angustissima summa setacea. Capitula e minimis generis ovata circiter sex lineas longa. Species quoad radicis indolem et achenia adhuc imperfectē nota habitu valdē singulari *Gageum villosam* quodam modo referens, propē *Sc. macrophyllum* Bunge in Lehm. (an F. et M.?) collocanda.

TARAXACUM DENUDATUM Boiss. et Noë.

T. rhizomate filiformi elongato ramoso (repenti?) nudo squamuoso nigro, collo inter squamas e basi persistenti petiolorum oriundas rufesceni-lanato, foliis.... antē florū evolutionem jam exsiccatis, pedunculis e collo 1–3 capitulo 2–4plō longioribus monocephalis pulverulento-hirtis squamulā minimā unā alterāve minimā obsitis, capitulis mediocribus, involucri polyphyllo phyllis glaucis triangulari-lanceolatis acutis apice minutē ciliatulis exterioribus brevioribus patentī-reflexis, acheniis pallidis angulatis striatis supernē squamuoso-muricatis rostro suo plūs dimidiō brevioribus.

Hab. in Persiā ad Kirrind propē Kermanchah cl. Noë. Floret Augusto.