

3. SCORZONERA *humilis*.

S. caule subnudo subunifloro, calycinisque squamis lanatis, foliis oblongo-lanceolatis nervosis planis. W.

S. caule subnudo unifloro, foliis lato-lanceolatis nervosis planis. *Hort. cliff.* 382. *Fl. suec.* 647; 685. *Mat. med.* 178. *Gort. ingr.* 118. *Mill. dict. n.* 2. *Scholl. barb. n.* 628. *Pollich. pal. n.* 723. *Hoffm. germ.* 272. *Roth. germ. I.* 248. *II.* 334.

Scorzonera lanata. *Schränk. bavar.* 2. p. 306.

S. humilis latifolia nervosa. *Bauh. pin.* 275.

S. humilis latifolia pannonica. *Clus. hist.* 2. p. 138.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 9. p. 11.

Niedrige Haberwurz. W.

*Habitat in Europae septentrionalioris pratis apricis.*

4 (v. v.)

Squamae calycinae basi et caulis apice et versus radicem lana tecti. Caulis plerumque uniflorus interdum vero multiflorus. W.

4. SCORZONERA *hispanica*.

S. caule ramoso, foliis amplexicaulibus lanceolatis integris basi sublerrulatis. W.

S. caule ramoso, foliis amplexicaulibus integris serrulatis. *Hort. cliff.* 383. *Hort. upf.* 242. *Gmel. sib.* 2. p. 6. *Gron. orient.* 244. *Mill. dict. n.* 1. *Scop. carn. n.* 951. *Blackw. t.* 406. *Kniph. cent.* 7. n. 83.

S. latifolia sinuata. *Bauh. pin.* 275.

S. major hispanica. 1. *Clus. hist.* 2. p. 137.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 9. p. 11.

Garten-Haberwurz. W.

*Habitat in Hispania, Hungaria, Sibiria.* 4 (v. v.)

\*5. SCORZONERA *glastifolia*. W.

S. caule subunifloro folioso, foliis lineari-lanceolatis acuminatis glabris nervosis planis. W.

Scorzonera graminifolia. *Hoffm. germ.* 272. *Roth. germ. I.* 334. *II.* 249.

S. angustifolia altera. *Buxb. halensf.* 298. *Rupp. jen.* 207. *Nonne erford.* 110.

Weidenblättrige Haberwurz. W.

*Habitat in Germaniae, Bohemiae, Silesiae collibus.* 4

(v. v.)

Planta polymorpha, variat caule uni-tri et quadri-floro, foliis lineari-lanceolatis, et oblongo-lanceolatis, similis *S. hispanicae* sed diversa: caule paucifloro, foliis longissime acuminatis utrinque valde attenuatis non serrulatis. Varietas foliis angustis a *S. graminifolia* est diversa: foliis caulinis brevioribus non carinatis nec rigidis, radicalibus longissimis, calycibusque nudis glabris. W.

\*6. **SCORZONERA caricifolia.**

*S.* caule subunifloro folioso adscendente, foliis lanceolato-ensiformibus glabris nervosis planis, radio calyce longiore. W.

*Scorzonera caricifolia.* *Pall. itin. 3. app. n. 131. t. J. i. f. 1. \**

Seggenblättrige Haberwurz. W.

*Habitat in depressis humidis subsalsis Sibiriae. 2 (v. f.)*

Caulis plerumque adscendens et uniflorus, interdum fere erectus et ramosus. Folia lanceolato-ensiformia Simillima *S. parviflorae*, sed distincta caule a basi ad apicem folioso nec basi tantum et superne nudo, radio corollae calyce longiore nec brevior. W.

\*7. **SCORZONERA parviflora.**

*S.* caule ramoso basi folioso, foliis lanceolato-ensiformibus glabris nervosis planis, radio calyce brevior. W.

*S.* caulibus ramosis, foliis lineari-ensiformibus integris, radio corollae brevissimo. *Murr. syst. veg. ed. 14. p. 710. Jacq. aust. 4. t. 305. Host. synop. 421.*

Kleinblumige Haberwurz. W.

*Habitat in pratis humidis Austriae, Pannoniae. 2 (v. f.)*

\*8. **SCORZONERA undulata.**

*S.* foliis lineari-lanceolatis attenuatis tomentosis undulatis, caule subramoso. *Vahl. symb. 2. p. 86. \**

*S.* foliis lanceolato-subulatis undulatis integerrimis, squamis calycinis exterioribus mucronatis. *Desf. atl. 2. p. 219. \**

*S.* graeca saxatilis, foliis angustis undulatis tomentosis. *Tournef. cor. 29.*