

DIAGNOSES PLANTARUM NOVARUM
IN TOMO XXIX FLORAE URSS COMMEMORATARUM

(ДИАГНОЗЫ НОВЫХ ВИДОВ, УПОМИНАЕМЫХ
В ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТОМ ТОМЕ)

Martio 1964

SCORZONERA L.

Subgenus *Podospermum* (DC.) Lipsch.

1. Series 1. *Laciniatae* Lipsch. — Plantae biennes caulibus evolutis foliatis. Achenia cylindrica glabra.

Seriesi typus: *S. laciniata* L.

2. Series 2. *Armeniaca* Lipsch. — Plantae perennes. Achenia saepe pilosa dimorphaque: externa — dilatata et alata, interna — tenuiora aptera.

Seriesi typus: *S. armeniaca* (Boiss. et Huet) Boiss.

3. Series 3. *Schischkinianae* Lipsch. — Plantae perennes. Collum radices pluriceps. Caules evoluti foliati. Calathidia minuta (ca. 8 mm lata in florescentia). Achenia glabra cylindrica.

In declivibus praemontanis distributae.

Seriesi typus: *S. Schischkinii* Lipsch. et Vass.

4. *S. Schischkinii* Lipsch. et Vass. sp. n. — *Podospermum Schischkinii* Vass. in Грощр. Опред. раст. Кавк. (1949) 508, descr. ross.

Rhizoma crassum pluriceps; tota planta subglabra vel praesertim in parte inferiore paulo arachnoidea; caules (10)15—25 cm alt., numerosi, tenues virgati, ramosi, foliati; folia pinnatisecta, basalia et caulina inferiora numerosa, petiolata, petiolis in vaginas dilatatis; radices collum vaginis petiolorum vetustorum dense vestitum; segmenta foliorum lateralia non numerosa plus minusve elongata angusta (1 mm lat.); folia caulina superiora diminuta, sessilia, integra basi duplo dilatata rix semiamplexicaulia. Calathidia numerosa ad apices caulis et ramorum solitaria anguste cylindrica minuta, 10—15 mm long., 3—4 mm lat. (in florescentia); involucrem griseo-tomentosum, phyllariis externis elongato-ovatis, internis oblongo-lanceolatis duplo longioribus; flores ligulares lutei, involucre paulo longiores, ligulae profunde fissae subfimbriatae; achenia 9—10 mm long. glabra anguste cylindrica costulata, basi clavulata paulo curvata, stipite 1.5—1.75 mm long.; pappus sordide albus achenium aequans setis plumosis. Fl. VI—VII.

nia cylindrica, glabra, costata. Pappus sordide albus totaliter caducus. setis plumosis 5—10 longioribus apice serrulatis.

Sectionis typus: *S. turkestanica* Franch.

23. Series 19. **Franchetianae** Lipsch. — Folia radicalia caulinaque lata, ovato-elliptica vel late lanceolata.

Seriei typus: *S. Franchetii* Lipsch.

24. Series 20. **Pauciflorae** Lipsch. — Calathidia anguste cylindrica, pauciflora. Phyllaria in numero 12—15.

Seriei typus: *S. turkestanica* Franch.

25. Series 21. **Racemosae** Lipsch. — Calathidia late cylindrica multiflora. Phyllaria in numero 20—32.

Seriei typus: *S. iliensis* Krasch.

26. Sectio 15. **Foliosae** (Boiss.) Lipsch. comb. n. — subsectio (§) *Foliosae* Boiss. Fl. or. III (1875) 756. — Folia pubescentia vel glabra. Caules foliati saepe alti. Achenia exteriora costis tuberculatis vel squamato-aciculatis.

Sectionis typus: *S. stricta* Hornem.

27. Series 22. **Strictae** Lipsch. Folia linearia.

Seriei typus: *S. stricta* Hornem.

28. ***S. gracilis*** Lipsch. sp. n.

Perennis. Tota planta ob pubescentiam e pilis plurimis stellatis canescenti-tomentella; radix cylindrica, collo reliquiis vaginarum rigidarum fuscarum foliorum emortuorum et vaginarum hyalinarum foliorum vegetorum vestito; caules 15—20 cm alti, stricti vel paulo ascendentes, simplices aut parum ramosi; folia anguste linearia valde pubescentia; radicalia — 2—4 mm lat. saepe longitudinaliter plicata apice subulata basi glabra vaginaliter dilatata, caulina — diminuta, pauca, sessilia vix semiamplexicaulia; folium supremum solitarium, saepe ad calathidium appropinquatum bracteiforme apice attenuatum longe aristatum. Calathidia solitaria vel in numero 2—5, magna, 2.5—3 cm long., 7—8 mm lat. in florescentia; involucrium canescenti-tomentellum phyllariis exterioribus ovatis vel triangulari-ovatis, interioribus oblongo-lanceolatis, margine membranaceis exteriora subduplo superantibus, omnibus plus minusve acuminatis; flores ligulares rosei (in sicco lilacini) subduplo involucrium superantes; achenia matura incognita, juvenilia costis vix muriculatis; setae inaequilongae plumosae serrulato scabridae. Fl. V.

Habitat in schistosis Asiae Mediae.

Typus: Pamir, Chorog, in vicinitate Horti Botanici, 27 V 1943, G. Nepli; in Herb. Inst. Bot. Ac. Sc. URSS in Leningrad conservatur.

Affinitas. A *S. pubescente* DC. pubescentia albo-tomentosa floribusque roseis valde differt.

29. Series 23. **Hispanicae** Lipsch. — Folia ovato-lanceolata vel lanceolata.

Seriei typus: *S. hispanica* L.