

donné, dans mes *Excursions botaniques aux environs de Jativa*, les caractères différentiels de cette dernière variété et n'ai point à y revenir.

Voici dès lors comment je comprends le *C. Seridis* :

C. Seridis L.

Var. *cruenta* Rouy (*C. cruenta* Willd.).

Var. *Seridis* (*C. Seridis* L.).

Var. *maritima* Lge (*C. maritima* Duf.).

***Centaurea linifolia* Vahl var. *submollis*.**

Diffère de la forme *genuina* par ses tiges plus courtes, plus abondamment velues, ordinairement simples, ses feuilles relativement plus courtes et plus larges, même les supérieures lancéolées-linéaires, toute à villosité plus fournie, molle et non rude comme dans la forme *genuina*.

***Microlonchus Valdemorensis* Cut.**

Plante rare, fort peu répandue dans les herbiers. La diagnose donnée par Cutanda (*Fl. de Madrid*, pag. 420), quoique un peu courte, indique cependant bien les caractères généraux de cette espèce, reconnaissable à ses tiges annuelles, de petite taille (5-25 centim.) mais robustes, couchées ou ascendantes, peu rameuses, très feuillées ainsi que les rameaux, à feuilles papilleuses-scabres, ondulées-dentées, spinuleuses, et surtout par ses calathides ovales-coniques, à écailles du péricline toutes aiguës-ristées, plus nettement encore que dans le *M. Ysernianus* Gay et Webb (in Graells, *Ramilletes*, pag. 9-10, tab. 3). — Le *M. Valdemorensis* est, sur le vif et même en herbier, bien différent du *M. Duriaei* Spach, dont M. Willkomm paraît porté à le rapprocher (*Prodr. fl. Hisp.*, II, pag. 169).

***Scorzonera graminifolia* L. var. *intermedia*.**

Tige de 2 décim., tomenteuse, très feuillée. Feuilles de 2-3 millim. de large, glabrescentes ou aranéuses par places. Calathides de grandeur intermédiaire entre celles des var. *major* et

minor Willk., à écailles externes du péricline pulvérulentes-tomentueuses, les intérieures glabres.

Zollikoferia resedæfolia Coss. var. *minor*.

Diffère de la forme *genuina* et de la var. *viminea* Lge par ses tiges plus courtes, dressées, très rameuses dès la base, à rameaux grêles, intriqués, divariqués, formant une touffe compacte, et par ses fleurs plus petites que dans la forme *genuina*.

Sonchus zollikoferioides Rouy

Calathides en corymbe lâche et pauciflore portées par des pédoncules allongés, *abondamment glanduleux*. Folioles du péricline lancéolées-linéaires, *pulvérulentes*. Achaines bruns pâtes, oblongs-obovés, munis sur les faces de côtes fines, ridés-chagrinés, non bordés. Feuilles épaisses, glabres, la plupart ramassées à la base des tiges, plus ou moins *glaucescences*, pétiolées, *pinnatiséquées*, à rachis étroit, linéaire, à segments tous étroitement linéaires, presque opposés par paires, entiers ou plus rarement pourvus à la base de 1-2 dents terminées ainsi que les segments par un micron calleux (comme dans les feuilles de *Zollikoferia*), dirigés en arrière, allongés, ténus; feuilles caulinaires moyennes à pétiole légèrement dilaté à la base, amplexicaule, à oreillettes presque arrondies, non longuement acuminées. Tiges de 1-2 décim., dressées, grêles, arrondies, striées. Racine bisannuelle ou vivace. — Feuilles presque semblables à celles du *Zollikoferia pumila* D C. — Port du *Z. resedæfolia* Coss.

Cette espèce ne peut être rapprochée que du *S. tenerimus* L. forme *pectinatus* D C., dont elle se sépare bien par les caractères soulignés dans la diagnose ci-dessus.

Andryala Rothia Pers.

Persoon caractérise ainsi cette plante pour la distinguer des *A. integrifolia* et *A. sinuata* L.: « *Caule basi ramoso diffuso, foliis ovato-lanceolatis subintegerrimis amplexicaulibus.* » (Syn. II, pag. 379.)