

Hab. in pratis montanis et subalpinis ad fl. Koksun, Tscharysch (L.) et Kergon (B.). Fl. Maj., Jun. 24.

Affinis *Sc. humili*. Caulis uniflorus, plerumque folio unico minuto nunc parum supra basin, nunc in medio, modo apicem versus instructus; *junior* aut totus, aut apice lanatus, demum glaber. Folia *radicalia* caule subduplo breviora. Anthodii *squamae* ovatae, ipso apice obtusae, ante explicationem lanatae, demum glaberrimae aut margine tantum parce lanuginosae. Corollulae exteriores longissimae.

3. SCORZONERA GRAMINIFOLIA. Linn.

Sc. subglaucescens, caule erecto pauci- (rarius uni-) floro, foliis lato-linearibus oblongisve acuminatis glabris nervosis subcarinatis, anthodii squamis ovatis glabris margine albo-membranaceis.

Sc. graminifolia. Linn. *Willd. Spec. pl. III. p. 1501.*

— *Spreng. Syst. veg. III. p. 666. No. 6.*

Scorzonera caule ramoso, foliis linearibus, acuminatis, carinatis, calycibus acutis. *Gmel. Fl. sib. II. p. 4.*

No. 3. (excl. synonym. Buxbaum. et forte omn.)

α. angustifolia: minor, foliis lato-linearibus.

β. latifolia: major, foliis oblongis.

Hab. in collibus apicis et campestribus siccis prope Smejow (L.) et ad fl. Kan (B.); *β.* ad fl. Tschuja (B.) et Irtysh (L. M.). Fl. April., Maj. 24.

Caulis plerumque 2-, rarius 3- aut 1-florus. Folia latitudine varia. Anthodii *squamae* ovatae, acuminatae, obtusae, glabrae, margine albo membranaceo cinctae.

An *Sc. austriaca Willd. Spec. pl. III. p. 1498.* re vera ab hac diversa?

4. SCORZONERA PARVIFLORA. Jacq.

Sc. glaberrima, caule subramoso obliquo vel ascendente, foliis oblongo-linearibus nervosis subcarinatis, anthodio radium subaequante.