

SYNGENESIA: POLYGAMIA ÆQUALIS. 797

2. SCORZONERA caule ramoso, foliis amplexicauli-hispanica, bus integris serrulatis. *Hort. cliff.* 383. *Hort. ups.* 242. *Gmel. sib.* 2. p. 6.
Scorzonera latifolia sinuata. Bauh. pin. 275.
Scorzonera major hispanica. 1. Clus. hist. 2. p. 137.
Habitat in Hispania, Sibiria. &
3. SCORZONERA foliis lineari-ensiformibus integris graminifolia carinatis.
Scorzonera lusitanica, gramineo folio, flore pallide-luteo. T. Buxb. cent. 2. p. 26. t. 21.
Scorzonera caule ramoso, foliis linearibus acuminatis carinatis, calycibus acutis. Gmel. sibir. 2. p. 4.
Habitat in Lusitania, Sibiria.
4. SCORZONERA foliis lineari-subulatis integris plapurpurea nls, pedunculis cylindricis.
Scorzonera caule ramoso tereti, foliis linearibus acuminatis, calycibus obtusiusculis. Gmel. sib. 2. p. 7. t. 2.
Scorzonera angustifolia subcaerulea. Bauh. pin. 275.
Scorzonera sylvestris, foliis angustis, flore caeruleo. Mentz. pug. 7. 1. f. 1.
Habitat in Marchia Brandeburgica, Sibiria.
Folia alterna, plana, remota. Pedunculi filiformes.
5. SCORZONERA foliis subulatis integris, pedunculo angustifolia. incrassato, caule basi villosa.
Scorzonera angustifolia prima. Bauh. pin. 275.
Scorzonera humilis angustifolia pannonica III. Clus. hist. 2. p. 137. t. 138.
Tragopogon pinifolium hispanicum. Barr. ic. 496.
Habitat in Hispania. Læsting.
Caulis vix spithameus, basi ramosus, villosus. Folia conferta, linearia, subulata, longitudine fere caulis. Pedunculi terminales, versus florem crassiores ipso caule. Flos magnus. Corolla lutea, subius purpurascens.
6. SCORZONERA foliis linearibus dentatis. *Roy. lugdb. laciniata.* 120. *Hort. ups.* 242. *Dalib. paris.* 242.
Scorzonera foliis laciniatis. Tournef. inst. 477. *Sauv. monsp.* 692.
Tragopogon laciniatum luteum. Bauh. pin. 274. *Raj. hist.* 251.
Habitat in Germania, Gallia. &
7. SCORZONERA foliis omnibus antrorsum dentato-tingitana, sinuatis amplexicaulibus.