

acuminatis, cæteris albo-marginatis.  $\mathcal{L}$  in Alpibus Austriacis. S. Alpina Hopp. ! pl. exs. et in Sturm deutschl. fl. 1. t. 51. S. Hoppeana Sieb. ex Reichenb. fl. exc. sp. 275. (v. s.)

19. S. MACRORHIZA (Schleich. ! pl. exs. Gaud. fl. helv. 5. p. 22), radice magnâ ad collum undâ, caule simplici aut subramoso apice pubescenti-lanuginoso, foliis radicalibus lanceolatis 5-nerviis, caulinis lineari-lanceolatis 3-nerviis, invol. oblongi squamis circ. 20 lanceolatis radio brevioribus, ligulis discoloribus.  $\mathcal{L}$  in torfaceis montosis Juranis circâ lacum de Joux legit cl. Schleicher ! Accedit ad S. plantagineam. Certè diversa à S. parviflorâ. Ligulæ luteæ subtus purpurascens. (v. s.)
20. S. CRÖCIFOLIA (Sibth. fl. græc. t. 785. ined. ex Smith prod. 2. p. 123), caulibus basi foliosis erectis simplicibus 1-cephalis, foliis linearibus laxis integerrimis involuacroque glaberrimis, nervo dilatato pallido, invol. squamis villo albo subtomentoso marginatis.  $\mathcal{L}$  in insulâ Zacyntho (Sibth. Marg. !), in rupesribus Melissæ (Zucc. !), ad montem Hymettum (Auch. ! n. 3331). Caulis sesquipedalis. Folia dimidiò breviora lineam lata. Cor. flavæ. (v. s.)
21. S. TENUIFOLIA (Schrad. ! in litt. 1809), glabra, foliis radicalibus angustè linearibus integerrimis, caule parcissimè folioso simplici 1-cephalo, invol. ovato-oblongi squamis exter. acuminatis, int. acutis, achæniis striato-angulatis secus angulos muricatis.  $\mathcal{L}$  in pratis alpestribus Pedemonti ad montem Bego propè Tendam ipse legi et circâ Bussolino cl. Balbis ! S. Austriaca Balb. ! misc. alt. p. 24 non Willd. Differt ab humili collo non fibrillis coronato et achæniis muricatis. (v. v. et s.)
22. S. HUMILIS (Linn. sp. 1112), radice cylindraceâ ad collum fibrillis coronatâ, foliis radicalibus ovali-oblongis aut lineari-lanceolatis glabris, caule subnudo simplici 1-cephalo, invol. ovali-oblongi squamis acutis margine membranaceis.  $\mathcal{L}$  in pratis collinis Europæ et Sibiriae. DC. fl. fr. n. 2979. Sc. nervosa Pers. ench. 2. p. 360. n. 2. S. graminifolia Ledeb. fl. alt. 4. p. 161. S. Austriaca Gaud. fl. helv. 5. p. 18. Collo fibrillis comoso ab omnibus ferè generis speciebus differt.
- $\alpha$ . *latifolia*, foliis elliptico- aut oblongo-lanceolatis plurinerviis.  $\mathcal{L}$  S. humilis fl. dan. t. 816 (sed fibr. rad. desiderantur). S. graminifolia  $\beta$ . Ledeb. S. lanata Schrank. — Clus. hist. 2. p. 138. f. 2. S. humilis Jacq. fl. austr. t. 36. hanc et seq. commixtas refer. (v. v. et s.)
- $\beta$ . *Austriaca*, foliis lineari-lanceolatis vix basi attenuatis capitulum ferè æquantibus. — in agro Vindobonensi undè verisim. S. humilis Jacq. sed icon. aut ex horto aut ex solo pingui petita priorem magis refert. S. Austriaca Willd. sp. 3. p. 1498. (v. s.)
- $\gamma$ . *linearifolia*, foliis linearibus subglaucescentibus. — in Sibiria et Ircutiâ. S. graminifolia  $\alpha$  Ledeb. fl. alt. 4. p. 161. S. Gebleri Bess. in litt. S. humilis angustifolia Turcz. ! in litt. S. angustifolia Thom. et flor. helv. non Linn. An species propr. Variat foliis infernè et præsertim caule glabro aut rariùs lanuginoso. (v. s.)
- $\delta$ .? *brevifolia*, foliis lineari-sublanceolatis caule triplò brevioribus, caule bifido 2-cephalo.  $\mathcal{L}$  in Chinâ boreali. Podospermum scorzoneroïdes Turcz. ! in litt. Fructus maturos non vidi, sed ex habitu toto et collo fibrilloso inter S. humilem et crispam media. (v. s. comm. à cl. Turczaninow.)
23. S. CRISPA (Bieb. fl. taur. 2. p. 234), glabra glaucescens, radicis collo fibrilloso, foliis radicalibus petiolatis lanceolatis undulatis nervosis utrinque acuminatis, caule folia linearia pauca gerente mono- aut oligocephalo, invol. squamis paucis exter. ovatis, int. oblongis.  $\mathcal{L}$  in Tauriæ collibus apricis. Flores ltei. Variat petiolis interdum basi lanatis et foliis planis nec sensim undulatis. Hanc ultimam è Tauriâ recepi sub nomine Sc. Prescottii. (v. s.)
24. S. HISPANICA (Linn. sp. 1112), radice cylindricâ, caule ramoso, ramis nudis apice 1-cephalis, foliis amplexicaulibus lanceolatis undulatis aut subdenticulatis glabris seu hinc indè subpubescentibus, invol. oblongi squamis glabris.

culis acuminatis.  $\mathcal{L}$  in Hispaniâ (Clus.) ubi contrâ viperarum ictus olim usitata, in Thuringiâ (Wallr.!) Blackw. herb. t. 406. Lam. ill. 647. f. 5. S. denticulata Lam. fl. fr. 2. p. 82. S. sativa Gater. fl. mont. 156. — Clus. hist. 2. p. 137. f. 1. opt. — in hortis culinariis vulgò culta ob radicem edulem. (v. v. et s.)

$\beta$ . *crispatula*, foliis ad margines crispato-dentatis.  $\mathcal{L}$  in Hispaniâ prov. Malaga in Sierra Mijar et Bonda legit cl. Edm. Boissier. (v. s. à cl. inv.)

25. S. TAURICA (Bieb. fl. taur. n. 1558 et suppl.), pubescens, caule erecto folioso polycephalo, foliis inferioribus lanceolatis integerrimis acuminatis, super. linearibus subulatis, invol. squamis acuminatis margine subtomentosis.  $\mathcal{L}$  in Tauriâ et Bessarabiâ collibus aridis. Affinis S. Hispanicæ sed pubes vagâ subtomentosa, rami præter peduncullos laterales nulli, invol. brevius, etc. Variat ex Bieb. lanugine minus canescente circâ Borysthenem et angustifolia sub-1-cephala ad Nartsanam. (v. s.)

26. S. MACROSPERMA (Turcz. in litt. 1833), glabra, caule erecto tereti fistuloso folioso, foliis elongatis lanceolatis plurinerviis semiamplexicaulibus integerrimis, capitulis 4-5 corymbosis pedicellatis, invol. squamis exter. ovatis brevibus, inter. lanceolatis elongatis, achæniis elongatis.  $\mathcal{L}$  in Dahuriâ herbosis propè Nerczinskoi-Savod et ad flumen Schitka detexit cl. Turczaninow. Habitu media inter Hispanicam et glastifoliam. Ab omnibus differt achænio ultrâ semen longè producto et quasi rostrato styli basi persistente mucronato. An sectiô propria? (v. s. comm. à cl. inv.)

27. S. GLASTIFOLIA (Willd. sp. 3. p. 1499. Reichb. fl. exc. 1. p. 276), radice subcylindraceâ, caule ramoso, ramis apice 1-cephalis, foliis ovali-lanceolatis basi amplexicaulibus planis acutis glabris, invol. oblongi squamis glabris acuminatis, achænio juniore subpubero.  $\mathcal{L}$  in collibus Thuringiâ (Wallr.), Germaniâ, Bohemiâ, Silesiâ (Willd.), Pedemontii? (Gaud.), Galliâ australis (Benth.). S. Hispanica  $\beta$ . Wallr. fl. hal. suppl. 3. p. 94. S. edulis Mœnch meth. 548. Valdè S. Hispanicæ affinis et potiùs var.? (v. v. et s.)

$\beta$ . *asphodeloides* (Wallr. fl. hal. suppl. 3. p. 94), foliis linearibus acuminatis strictis carinatis basi vaginantibus.  $\mathcal{L}$  in Germaniâ. S. graminifolia Hoffm. fl. germ. 272. S. angustifolia Wahl. ex Wallr. An potiùs S. montanæ var.? (v. s.)

28. S. MONTANA (Mutel fl. dauph. p. 268), radice cylindraceâ supernè nudâ, caule simplici aut subramoso parcè lanuginoso, foliis linearibus lanceolatis basi attenuatis subcarinatis apice acuminatis hinc indè sublanuginosis, invol. ovato-oblongi squamis 10-12 glabris lanceolatis, exter. brevioribus.  $\mathcal{L}$  in pratis montanis Delphinatûs (Mutel) et Sabaudiâ (Bonjean!). Proximè accedit ad S. glastifoliam var.  $\beta$ . sed lanugine caulis et fol. infer. differt? (v. s.)

$\beta$ . *Bœtica* (Boiss. ined.), foliis et invol. squamis angustioribus.  $\mathcal{L}$  inter dumeta circâ Esteponom Hispanorum legit cl. E. Boissier. (v. s. comm. à cl. inv.)

29. S. PARVIFLORA (Jacq. austr. 4. t. 305. Ledeb. fl. alt. 4. p. 161), glabra, collo multicipiti nudo, caule adscendente folioso 1-4-cephalo, foliis linearibus lanceolatis subensiformibus integerrimis acuminatis basi attenuatis, invol. cylindrici squamis lanceolatis, int. elongatis, ext. subbracteiformibus, ligulis vix expansis. invol. paulò longioribus, achæniis lævibus.  $\mathcal{L}$  in humidis sublimosis subsalsis in Hungariâ ad lacum Nœnsiedl (DC.), in Galliâ littoribus Mediterraneis (Benth.), in Sibiâ Altaicæ (Bess.) in deserto Noryn et ad Salinas Ilezkienses (Pall.), ad Tanajm (Stev.) in deserto Songoro-Khurgisico (Ledeb.). S. caricifolia Pall. itin. 3. app. n. 131. t. Ji. ed gall. app. n. 391. t. 99. f. 1. Folia 7-8 poll. longa, 4 lin. lata. (v. v. et s.)

30. S. BUPHTHALMOIDES, glabra erecta, caule parcè ramoso folioso, foliis linearibus apice callosis rigidulis integerrimis, super. basi dilatatis, invol. glabro imâ basi tomentoso, squamis acuminatis subpatulis ligulas subæquantibus.  $\mathcal{L}$  circâ Aleppum legit cl. Aucher! S. graminifolia Auch. pl. exs. n. 3533 non Linn. Species insignis ob capitula expansa nec cylindracea, Buphthalmum salicifolium foliis et habitu capituli referens. (v. s. comm. à cl. inv.)