

**Anthemis deserticola** H. Krasch. et M. Pop. sp. n. — Annuā, glabra, caulibus 10—12 cm altis, tenuibus, striatis, simplicibus vel ramosis, ramis elongatis unicapitulatis, filiformibus apice subincrassatis. Folia crassiuscula integra, anguste linearia, 1—3 cm longa, 1—2 mm lata, apice obtusa, interdum 2—3-fida vel irregulariter pinnatisecta, laciniis anguste-linearibus. Capitula solitaria, parva, 3—5 mm lata. Involucrum imbricatum, squamae exteriores lanceolatae, anguste scariosae, squamae interiores ovatae obtusae, apice late scariosae. Ligulae albae, oblongae apice emarginatae, 2 mm longae. Receptaculum obtuso-conicum, paleis subulatis longe acuminatis. Achaenia subcurvata, obconica, 1 mm longa, 4—5 costata, costis albis subulatis, apice obliqua et breviter coronata, corona margine lacerata.

Kazakstania: in desertis arenosis Kzyl-kum inter put. Turd-kuduk et Kutun, 23. IV. 1916, n° 20 (Filatov). — Uzbekistania: in desertis „Golodnaja Step“, in salsis, 4. X. 1910, n° 29 (N. Dimo).

*A. deserticola* nob. хорошо отличается от *A. (Maruta) microcephala* (Schrenk) Rgl. характером семян и чешуй обертки, цельными или мало рассеченными листьями, а также ареалом (распространена в южных районах Туранской низменности, в то время как *A. microcephala* связана с Джунгарской низменностью).

**Scorzonera iliensis** H. Krasch. sp. n. (sect. *Euscorzonera* DC. § *Foliosae* Boiss. Fl. or. III, p. 756). — Parce pubescens vel subglabra, glaucescens. Caules (1—2) 40—150 cm alti, firmi, costati, simplices vel parce ramosi. Folia longa, lanceolato-linearia vel linearia plana, margine scabridula, utrinque nervis 3—5 albis prominentibus, apice longe acuminata, folia radicalia et caulina inferiora 20—36 cm longa, 4—10 mm lata, folia summa minima linearia, longe acuminata uninervia. Capitula pedunculata, elongata, 2.5—3 cm longa, 1 cm in diam. Involucrum valde imbricatum, squamae exteriores triangulari-ovatae vel ovato-lanceolatae, dorso interdum carinatae, squamae interiores lineares apice obtusae. Flosculi lutei. Achaenia subincurva glaberrima interdum obscure costata, pappus albus plumosus.

Kazakstania: prope flum. Tekes (Krasnov); pag. Ilijskoe, ad flum. Ili, 28. VI. 1903, n° 3809 (W. Lipsky); ad flum. Ili, in pratis, 1930 (Nikitin et Russanov); inter pagos Czukji et Usuntam, in phragmitetis, 29. VI. 1912 (Saposhnikov et Schischkin).

Форма — связанная с влажными лугами главным образом р. Или, в низовьях которой, по наблюдениям С. А. Никитина, местами растет массаами. От близкой *S. stricta* Hornem. отличается более крупным ростом, (до 1½ м), длинными плоскими листьями, по краям слегка шероховатыми, почти или совсем гладкими семянками, экологией.

**Scorzonera Woronowii** H. Krasch. sp. n. (sect. *Euscorzonera* § *Tomentosae* Boiss. Fl. or. III, p. 756). — Tota densissime niveo-pannosa, caules 20—35 cm alti, crassi, dense foliosi, simplices vel superne simpliciter et breviter ramosi. Folia caulina plurinervia, inferiora late oblonga in petiolum brevem attenuata, 8—10 cm longa, 2.5—5 cm lata, superiora sessilia ovata, apice breviter acu-