

dosis australis prope fl. Kulduk alt. 9—10 000', 28. VI. 1895. leg. S. Korschinsky (Herb. Horti Botanici Petropolitani).

Species in memoriam acad. S. J. Korschinsky nominata.

2. **Scorzonera Inula** Lipschitz. (in S. J. Lipschitz. Systematische Notizen über asiatische Scorzoneren. Moskau 1932. S. 19 mit Tabelle. Russisch und lateinisch).

Perennis a basi ramosa. Caules striati, glabri pauci atque disperse foliosi, internodiis plusminusve elongatis. Folia alterna vel in parte superiore subopposita, late lanceolata apice ± attenuata (ea *Inulam* quaedam in mentem revocantia, unde nomen), plana vel rarissime subundulata, 5—8 nervia, marginibus angustissime membranaceo-marginatis, sub lente ± denticulatis. Capitula (1—4—5) cylindracea, ad 6,5 cm longa, foliis summis oppositis suffulta. Involucrum pluriseriale, mucido-pubescent. Squamae exteriore atque mediae late-ovatae obtusiusculae, intimae linear-lanceolatae elongatae. Flores in sicco roseo-violacei. Achenia elongata, rostrata scabriuscula in sicco rubella vel alba.

Habitu *Inulas* quasdam in mentem revocans, foliis late-lanceolatis apice ± attenuatis, capitulis basi foliis oppositis suffultis, pro maxime parte solitariis a *Scorzonera tragopogonoide* atque speciebus ei proximis bene differt.

Typ. spec.: 1) Buchara. Terra Hissar, Schamaly prope Chanaks 5200' alt. 2. VII. 1896. Nr. 4796. V. J. Lipsky (Herb. Horti Petropol.).

2) Buchara. Terra Hissar, Truschby 4900' alt. 30. VI. 1896 No. 4797. V. J. Lipsky (Herb. Horti Petropol.).

3) Terra Hissar. Montes Sanglak prope Tut-kau. Ad declivia argillosa. 4. VI. 1932. No. 14. F. Zapriagaev et Tekutjev. (Herb. Hummi Institutionis Mosquensis.)

4) Terra Kuliah. Prope Kostrosch in fruticeto 1600 m alt. 16. VI. 1932. F. Zapriagaev et Tekutjev (*ibid.*).

3. **Scorzonera Nikitini** Lipsch. (In S. J. Lipschitz, Systematische Notizen über asiatische Scorzoneren. Moskau 1932 p. 20 mit Tabelle [Russisch und lateinisch]).

Perennis mono- vel oligocephala. Caules (1—4) elati, scapiformes, striati, pubescentes sub capitulis plusminusve inflati. Collum basi reliquis brunneis foliorum vetustorum partim demum in fibras solutis vestitum. Folia radicalia anguste linearia, graminea, caulina pauca, alterna sensim decrescentia, summa squamiformia, omnia puberula, demum glabrescentia. Capitula solitaria. Flores mihi ignoti, desiderantur. Involucri squamae exteriore paucæ ad 6, minutissimæ triangulatae, ovatae; inferiores subcoriaceæ, membranaceo-albomarginatae, laeves, angusto-lineares, apice subacuminatae, ad 5—6 cm longae. Achenia longissima, tenuissima atque angustissima rostrata, scabriuscula. Pappus sordidus setis plumosis apice nudis sub lente minutissime denticulato-scabridis.