

Примечание: Очень изменчиво; повидимому, распадается на несколько рас.

Род *Scorzonera* L.

Корзинки многоцветковые. Покрывала черепичатые. Цветоложе голое. Семянка линейно-цилиндрическая, кверху немного суженная, гранистая, при основании с углубленным рубчиком. Летучка из перистых, переплетающихся между собою неодинаковых волосков.

- 1. Семянки по всей длине густо волосистые 2.
- Семянки голые, иногда бугорчатые, но не волосистые 7.

2. Корневище цилиндрическое, на некоторой глубине клубнеобразно утолщенное, размер утолщения немного больше ореха. Листья сосредоточены у основания стебля, извилистые, линейно-ланцетные, вместе со стеблем и покрывалом густо бело-паутинисто-шерстистые. Корзинки одиночные, шир. 7—10 мм. Листочки их ланцетные, заостренные, наружные часто равны внутренним. Цветки желтые, снаружи красные, мало превышающие покрывало. Семянки обратно-конические, густо волосистые; хохолок рыжеватый, вчетверо длиннее семянки. Стебель 10—20 см. выс.—Сев.: Тер.: Гр.: Кут. (с) Тиф. (сю) Аз. Ган. (сю). На сухих склонах в средней горной зоне.

S. lanata M. B.

- Корневище цилиндрическое или веретеновидное, без утолщения. 3.
- 3. Листья широкие, ланцетные или широко-ланцетные . . . 4.
- Листья узко-линейные, 1—5 мм. шир. 5.

4. Прижато пушистое, серое, реже беловатое. Листья ланцетные, нижние сужены в черешок, стеблевые сидячие, к основанию слегка суженные, пяти-девятинервные. Корзинки продолговатые, 10—15 мм. шир. на б. или м. длинных ножках, на которых сидят немногие линейно-шиловидные листочки, образуют продолговатое соцветие. Листочки покрывала ланцетные, острые. Семянки цилиндрические, густо волосистые, хохолок рыжеватый, равен семянке. Стебли прямые, слабоветвистые, 40—60 см. выс.—Гр.: Тиф. (ю) Аз.: Карабах. Ар.: Эр. Нах. Тур.: Сурм. Ольт. В горной зоне, на сухих склонах.

S. nervosa Trev.

(=*S. latifolia* D. C.)

V. glabrata Trautv.—Растение серо-зеленое, мало пушистое.—Тур.: Сурм.

Все растение густо бело-войлочное. Листья более широкие, нижние ланцетные, сужены в черешок, стеблевые широко-ланцетные, при основании суженные. Соцветие почти щиткообразное, вследствие большой длины нижних цветоножек, усаженных ланцетными листьями, из которых верхние у самой корзинки. Корзинки продолговатые, 10—15 мм.

8. Все листья сосредоточены при основании стеблей, многочисленными, линейными, извилистыми, по краю часто волнистыми, прижато серовато-пушистыми или почти голыми. Цветоносные стебли выс 8—15 см. Корзинки широко цилиндрические, около 10 мм. шир. Листочки покрывала немногочисленные, пушистые, наружные яйцевидно-продолговатые, острые, внутренние значительно длиннее эллиптически-линейные, туповатые. Цветки интенсивно-красные, в полтора раза длиннее покрывала. Летучки немного длиннее тонкой поперечно-чешуйчатой бородавчатой семянки. Корень клубневидно вздут, до 4—5 см. шир.—Ар.: Эр. На х. Тур.: Арарат Сурм. Кагызм. Ольт. На сухих каменистых склонах.

S. suberosa C. Koch

Листья по всему стеблю, широко-ланцетные 9.
9. Нижние листья продолговато-ланцетные, остро-зубчатые или перисто-надрезанные, верхние стеблеобъемлющие, продолговато или линейно-ланцетные, зубчатые или надрезанные. Корзинки на длинной ножке. Листочки покрывала от наружных яйцевидно-сердцевидных, шире своей длины, островатых до продолговато-ланцетных тупых внутренних. Цветки розовые, вдвое длиннее покрывала. Семянки 15—18 мм. дл., глубоко бороздчатые и гранистые. Хохолок короче семянки. Корневище вертикальное, шейка густо пленчатая.

S. incisa D. C.

У нас только *V. dentata* E. Bordz.—Листья зубчатые (не надрезанные)—Тур.: Кар. На сухих склонах.

Нижние листья продолговатые, острые, оттянутые в черешок, следующие стеблеобхватывающие, оттянутые, все цельнокрайние, но по краям б. или м. курчаво волнистые. Корзинки на длинных ножках, цилиндрические, около 15 мм. шир. Листочки покрывала тупые, бело-окаймленные, нижние яйцевидные, внутренние продолговато-ланцетные. Цветки ярко-розовые в 1½ раза длиннее покрывала. Семянки короткие, 8—10 мм. дл., остро-четырёхгранные, поперечно-бугорчатые, хохолок белый, длиннее семянки. Корневище вертикальное, клубневидно-вздутое, шейка голая.—Ар.: Эр. На х. На сухих бесплодных склонах.

S. papposa D. C.

(= *S. paradoxa* C. A. M.)

10. Цветки в 1½ раза длиннее покрывала, ярко-желтые и при основании пурпуровые. Покрывало над основанием суженное; листочки его широкие, перепончатые, наружные яйцевидно-сердцевидные. Корзинки крупные, одиночные, на длинных ножках. Листья сосредоточены у основания стеблей, цельнокрайние или б. или м. надрезанно-зубчатые, продолговатые или продолговато-ланцетные, стеблевые сильно уменьшенные. Стебли выс 20—60 см., прямые, крепкие.—На х. На сухих склонах в горах.

S. Karjagini Grossh. (sp. nova)