

Hab. propè Erzeroum Auch. № 4882, in *Armeniâ* circâ *Kochapounar*, cl. Huet du Pavillon.

Folia 2-3 pollices longa  $1\frac{1}{2}$ -2 lineas lata. Scapus 2-4 pollicaris. Capitulum angustum ferè pollicare. Affinis *Sc. stenocephalæ* quæ differt radice apice in cylindrum productâ, collo vaginis scariosis numerosis vestito, capitulis minoribus, involucri phyllis angustis.

**SCORZONERA KURDICA** Boiss. et Noë. (Sect. *Euscorzonera*.)

S. radice minutâ ovatâ subtû fibrillas tenues edenti, caule pumilio medium versùs in 3-5 ramos arcuatos monocephalos diviso, foliis radicalibus et ad caulis divisionem copiosis angustè linearilanceolatis margine undulato-crispis apice longè attenuato-acuminatis glabrescentibus, rameis paucis minutis e basi latiori amplexicauli lanceolatis, capitulis cylindricis, involucri phyllis 7-9 glabris pallidè virentibus inferioribus triangulari-ovatis multò brevioribus cæteris lanceolatis omnibus obtusis, flosculis pallidè roseis involucro longioribus, acheniis brevibus obconicis sulcatis ad costas denticulato-scabris pappo niveo eis duplò longiori terminatis.

Hab. in subalpinis Persiæ in *Kurdistanâ* propè *Mendeli* cl. Noë. Flor. Mayo.

Planta 5 pollicaris, folia 2 lineas circiter lata, rami sesquipollicares, capitulum ferè pollicare. Affinis speciei præcedenti a quâ sat differre videtur radice minutâ non corticoso-squamosâ, caule ramoso, foliis apice longè attenuatis, involucri phyllis inferioribus valdè abbreviatis.

**SCORZONERA SYRIACA** Boiss. et Blanche. (Sect. *Euscorzonera*.)

*Sc.* radice cylindricâ tenui squamis fuscis ad collum modicè obsitâ, caule erecto ad medium usquè folioso monocephalo glabro, folijs radicalibus basi attenuatis gramineis linearibus plurinerviis apice attenuatis glabrescentibus, caulinis brevioribus basi rotundatâ sessilibus, capitulis cylindrico-obconicis, involucri phyllis 9-11 tomento brevissimo tandem sæpè detersili obsitis infimis brevisimis triangularibûs acutis intimis lanceolatis obtusis, flosculis luteis involucro sesquilongioribus, acheniis striatis exterioribus parte superiori sparsim et minutè scabris cæteris laevibus, pappi rufescentijs achenio longioris setis 5 longioribus apice nudis.