

SCORZONERA LACERA Boiss. et Balansa. (Sect. *Euscorzonera*.)

Sc. perennis parcissimè farinosa demùm glabra viridis, radice verticali cylindricâ, caule tereti infernè tantùm folioso simplici erecto monocephalo vel basi ramos arcuatos monocephalos edenti, foliis radicalibus vel inferioribus pinnatipartitis laciniis longis linneari-lanceolatis patentibus acutis integris vel basi denticulatis rachide plus minus latâ lacinulis minutis inter laciniias auctâ, folio superiori saepius unico angustiori basi tantum pinnatifido, capitulis longè pedunculatis sub anthesi cylindricis, involucri glabri phyllis paucis ab infimis ovatis breviter acuminatis ad superiora lanceolata acuta sensim auctis, flosculis roseis involucro subduplicite longioribus, acheniis abbreviatis supernè parùm angustatis transversè echinulatis pappo niveo eis æquilongo superatis.

Hab. ad *Bouloukti* circâ *Mersina* Ciliciæ littoralis cl. Balansa.

Planta pedalis vel sesquipedalis, folia 4-5 pollices longa laciniis saepè pollicem vel sesquipollicem longis. Squamæ involucri fructiferi interiores pollicem longæ, achenia 4 lineas tantum longa. Species inter purpureas affinis soli *S. incisæ* formâ foliorum, involucrique squamis abbreviatis obtusis, acheniis brevibus eximiè distinctæ.

TRAGOPOGON SAMARITANI Heldr. et Sartori.

Tr. radice verticali fibrillosâ, collo inter vaginas foliorum inferiorum densè confertorum lanato, caule tenui erecto simplici vel semel bisve saepè propè basin furcato, foliis radicalibus et inferioribus infernè subdilatatis valde lanatis supernè glabris angustissimè linearibus, caulinis sparsis similibus abbreviatis basi saepè evidenter dilatatis, pedunculis etiam fructiferis vix incrassatis, anthodii glaberrimi phyllis quinque lanceolatis corollam subsuperantibus pappo subbrevioribus, flosculis paucis flavescentibus, acheniis marginalibus infernè laeviusculis supernè muriculatis obtusangulis in rostrum sensim attenuatis.

Hab. in regione superiori montis *Parnassi* Guicciardi ex Heldreich, in regione mediâ in montis *Parnes* Atticæ Heldr.

Caulis $\frac{1}{2}$ -4 pedalis tenuis, folia inferiora vix lineæ $\frac{1}{4}$ lata. Ha-