

mam achenii partem superiorem vestientem solutæ. Pappus a lanâ achenii indistinctus setis quinis interdum longioribus et apice scabris. Plantæ annuæ. — Sectio ad *Tourneuxiam* Cass. accedens. Species propositæ ex specimenibus nimis paucis observatæ et forsân reducendæ.

* Achenia a medio sursum lanata.

S. hemilasia, nana, cenopleura.

** Achenia sub apice tantum lanata.

S. acrolasia, ammophila.

SECT. I. PODOSPERMUM.

1. **S. laciniata** (L. Sp. 1114 non Jacquin) biennis, glabriuscula vel canescens, collo fasciulis sterilibus destituto, caule unico erecto vel pluribus ramosis lateralibus sæpe ascendentibus vel procumbentibus ramisque teretibus minute striatis, foliis pinnatipartitis laciniis linearibus vel lanceolatis acuminatis basi sæpe angustatis terminali majore, capitulis majusculis, involucri phyllis interioribus intus glabriusculis, flosculis marginalibus involucri æquantibus vel vix longioribus, acheniis glabris griseis angulato-striatis, pappo sordido achenio æquilongo ②. Hujus speciei polymorphæ varietates binæ sequentes in ditone occurrunt.

α. *genuina*. — Foliorum lacinia linearis vel lineari-lanceolata terminalis sæpe lanceolata. — *P. laciniatum* D.C. Fl. Fr. Ic. Rchb. tab. 35 et *P. muricatum* D.C. — *Scorzonera octangularis* Willd. Sp. III, p. 1506.

Hab. in cultis Rumeliæ (Friv.), Byzantii (Noël), Iberiæ Caucasiciæ (Rupr!).

β. *calcitrapifolia* Bisch. — Foliorum lacinia lanceolata ellipticæ oblongæ vel obovatæ. — *P. calcitrapifolium* D.C. Fl. Fr. — *P. intermedium* Guss. D.C. Prodr. VII, p. 110. — *P. resedifolium* D.C. et *Scorzonera resedifolia* Vahl. — *P. Buxbaumii* et *P. heterophyllum* C. Koch Linn. XVII, p. 274. — *P. Messeniacum* var. *brevicaule* Heldr. et Sart. Mss.

Hab. in herbis et cultis Græciæ ad Athenas et Megaram (Boiss! Heldr!), Oropo Beotiæ (Boiss!), Pamphyliæ et Pisiæ (Heldr!), Caucasi et Transcausiciæ (Ledeb., Szov!), Persiæ occidentalis (Bunge!), Belutschiciæ (Stocks!).

Ar. Geogr. Europa media et australis a Galliâ et Germaniâ mediâ ad Rossiam australem, Africa borealis.

2. **S. Jacquiniæ** (Koch Syn. p. 489 sub *Podospermo*) perennis glabrescens vel plus minus canescens vel cana, collo caules flori-