

Scorzonera lamellata H. Krasch. sp. n. (sect. *Euscorzonera* DC. § *Fo-
liosae* Boiss. Fl. or. III, p. 756). — Sub lente minute et crispule pubescens,
radix tuberoso-incrassata, collum petiolorum reliquiis fusco-vaginatam. Caules
30—35 cm alti, valde sulcati, in parte media ramosi, pedunculis longis. Folia
anguste-linearia vel linearia, interdum anguste lanceolato-linearia, plus minusve
longe attenuato-acuminata, basi dilatata subvaginata, 2—6 mm lata, 10—15 cm
longa, margine plana vel undulato-crispa, crassiuscula. Capitula anguste cylin-
drica, fructifera 25—35 mm longa, 8—10 mm in diam. Flosculi lutei (?), squa-
mae valde inaequales, glabrae vel villosae, pilis nigris, squamae exteriores
ovatae vel late lanceolatae, 7—15 mm longae, apice acuminatae, squamae
interiores anguste lanceolatae, 25—35 mm longae, nervis parallelis plus
minusve valde prominentibus. Achaenia cylindrica, elongata 14—17 mm longa,
sulcata, matura transverse valde lamellato-muricata et nigra, stipes cavus
2 mm longus, pappus albus vel pallide fuliginosus, 10—12 mm longus.

Transcaucasia (nunc Turcia): in distr. Kaghyzman, in angustiis prope
Kjul-ogly, in clivis argillosis, 5. VI. 1913, n° 12689 (G. Woronow).

От близкой *S. mollis* M. B. отличается длинными узко-цилиндриче-
скими корзинками, черными семянками, окрашенным хохолком; от выше-
описанной *S. colorata* H. Krasch. отличается узкими цилиндрическими
корзинками, более узкими листочками обертки, линейными листьями,
менее сильно окрашенным хохолком.

Scorzonera ferganica H. Krasch. sp. n. (sect. *Euscorzonera* DC. § *Scap-
osae* Boiss. Fl. or. III, p. 755). — Parce dense araneosa demum glabra, radice
tuberosa, collo longe squamoso. Caules in parte media dichotome-ramosi,
10—14 cm alti. Folia valde variabilia, radicalia late-linearia, basi plus minusve
amplexicaulia, folia caulina lanceolato-linearia, interdum lanceolata plus
minusve acuminata, 4—8 cm longa, 4—14 mm lata, margine crispato-denticu-
lata, basi cuneata vel rotundata. Pedunculi 3—6 cm longi. Capitula media
anguste cylindrica, 4—6 mm in diam., 2.5 cm longa. Squamae glabrae, angu-
ste membranaceae, interiores 25 mm longae, 4.5—5 mm latae, anguste lanceo-
latae, apice obtusatae, venulis parallelis numerosis; squamae exteriores lato-
ovatae, 4—5 mm longae, apice obtusatae. Flosculi lutei in parte superiore
subtus lilacini. Achaenia subincurva angulata ad costas plus minusve dense
denticulato-hamata, 7 mm longa. Pappus niveus, plumosus multisetus, 12—14 mm
longus.

Asia Media: Tadjhikistania, in distr. Margelan (olim), ad flum. Kalita-
Karamuk, 20. VI. 1913 (N. Dessjatova et G. Dolenko).

От близкой *S. picridioides* Boiss. отличается ланцетно-линейными
листьями, мелкими корзинками.

Launaea Popovii H. Krasch. sp. n. — Annuā, glabra, caules 1—4,
12—22 cm alti, dichotome-ramosissimi, superne paniculato-corymbosi, ramis
ultimis filiformibus. Folia radicalia rosulata, crassiuscula, 1.5—2 cm longa,
late-obovata, irregulariter eroso-dentata, dentibus apice cartilagineis, folia
caulina inferiora anguste linearia, 4—6 cm longa, superiora minima. Involu-