

Sc. humilis tuberosa glabra syriaca. *Morif. hist. 3. p. 83. sect. 7. t. 6. f. 16.*

In campestribus Caucaſo ſubjacentibus occurrit et ad Wolgam circa Zarizyn frequens. Floret Majo. 2

1574. SCORZONERA *lanata.*

Sc. caule unifloro baſi folioſo, foliis lineari-lanceolatis undulatis undique ſericeo-lanuginofis, radice tuberoſâ.

Sc. tuberosa humilis. *Morif. hist. 3. p. 83. sect. 7. t. 6. f. 17.*

Habitat in Iberiae collibus ficcis circa Tiflin. 2

*Statura, habitus et radix* praecedentis, ſed tota planta pilis molliffimis candidiffimis elongatis veſtita. *Folia* pleraque radicalia: uno tantum alteroue ad baſin caulis ſubnudi lanuginofi. *Calyx* etiam totus lanuginofus: ſquamis lanceolatis. *Corollulae* luteae.

1575. SCORZONERA *pufilla.*

Sc. caule ramoſo procumbente foliis filiformibus apice circinnatis, radice tuberoſâ.

Sc. foliis filiformibus apice circinnatis, caule ramoſo. *Linn. ed. Willd. 3. p. 1501. Pall. itin. 2. app. n. 122. t. L.*

Habitat in arenâ mobili deſerti Caucaſico-caſpici: circa Aſtrachan quoque reperitur. Floret Majo. 2

*Radix:* tubera onata concatenata in arenam alte deſixa ſapida.

1576. SCORZONERA *laciniata.*

Sc. foliis inferioribus pinnatifidis linearibus: ſuperioribus linearibus, calycibus glabris: ſquamis inferioribus patulis mucronatis. *Linn. ed. Willd. 3. p. 1506. Jacq. austr. 4. p. 29. t. 356. Hall. hist. n. 12. Pall. ind. taur.*