

CLASSIS XVIII. SYNGENESIA.

bart; wilde Haferwurzel; Josephblume. G. Réti bakszakáll; kakuk pogátsa. H. La barba di becco, o Sassefria di prato. I. La Barba de Caprâ. V. In pascuis graminosis, pomariis et pratis depressis elatioribusque frequens. Maj.—Aug. P.

—undulatus. L. 1613. T. caule bipedali, erecto, ramoso, tereti, striato, glabro; fol. alternis, sessilibus, basi vaginalibus, oblongo-linearibus, integerrimis, acutis, margine undulato-crispis; flor. pedunculatis, erectis, e sulphureo-luteis, peduac. terminali, maximo, magis incrassato; anthodio corollularum radium subaequante. J. rar. t. 158.

Undulated Goat's Beard. A. Le Salsifis ondulé. G. Wellenblättriger B. G. Habos bakszakállfű. H. In pomariis, pascuis, pratis versurisque ubique. Jul. Aug. P.

major. L. 1644. T. caule pedali, striato, glabro; fol. linear-lanceolatis, basi latioribus, strictis, integerrimis, apicem versus pendulis; pedunculo superne incrassato; anthodii foliolis 12 plurimisque constantibus corollularum radio luteo apice rotundato longioribus. J. A. t. 29. L. Ill. t. 646. f. 1.

Great Goat's Beard. A. Le grand Salsifis ou le Salsifis à gros pédoncule. G. Grosser B. G. Nagy bakszakállfű. H. La Sassefria maggiore. I. In hortis et pomariis, item in pratis vineisque et ad nemorum margines valde communis. Jul. Aug. P.

CCCCXXXVII. SCORZONERA. L. G. 1230. *Vipers-grass. Angl. La Scorzonère. Gall. Haberwurz. Germ. Artifiola. Hung.*

Ch. GEN. Anth. imbricatum, oblongum, inaequale, acuminatum, squamis margine scariosis. Recept. verrucosum. Sem. sessilia, pappo plumoso sessili coronata.

austriaca Willd. 1615. Sc. caule digitali, erecto, simplicissimo, striato, glaberrimo, 1-floro; fol. integerrimis, nervosis, acuminatis, glabris, ra-

CLASSIS XVIII. SYNGENESIA.

9

dical. in orbem digestis, lanceolatis, basi lana-tis; *caul.* semiamplexicaulibus, lineari-lanceo-latis, anthodii squamis *exteriorib.* latioribus, bre-vioribus, *interiorib.* 3-plo longioribus, margine membranaceis, sphacelatis, glabris, seminibus oblongis, striatis. *Sc. humilis.* Host. J. A. t. 36. *Sc. hum.* angustif. *Pann.* III. *Cl. h.* II. p. CXXXVIII.

Austrian Viper's-grass. A. *La Scorzoneré d' Au-triche.* G. *Oesterreichische Haberw.* G. *Austriai ártifióla.* H.

In apricis collibus, et versuris vulgaris. Apr. — Jun. P.

— *humilis* L. 1616. *Sc.* caule cubitali altioreque, cras-so sulcato, subnudo, sub-1-floro; fol. in pe-tiolum excurrentibus, ovato-lanceolatis, planis, integerrimis, 5- vel 7-nerveis, anthodiis squamis basi latis lanatisque, ovato-lanceolatis. *Sc. angustifolia* Scholl. *Sc. lanata.* Schrank. *Sc. humi-lis latif.* *Pann.* II. *Cl. h.* II. p. CXXXVIII. ic. *Ej. Pann.* p. 637. ic.

Humble Viper's-grass. A. *La Scorzoneré humble.* G. *Niedrige Haberwurz;* teutsche *Scorzonerenwur-zet;* *Viperwurz* G. *Alatsony ártifióla.* H.

In pratis sylvaticis versus Lövete et Olahfalva. Maj. Jun. P.

* *lanuginosa.* 1617. *Sc.* caule pedali, erecto, angu-lato-sulcato, striato, superne ramoso; fol. alter-nis, semiamplexicaulibus; oblongo-ovatis, lan-ceolatis, passim margine undulatis; *caul.* lineari-acutis; florib. corymbosis, pedunc. solitariis, in-aequalibus, apice incrassiusculis, anthodii squa-mis ovato-lanceolatis, exterioribus reliquis 3-plo longioribus, magis coloratis, corollulis e sulphureo-luteis.

Wooly Viper's-grass. A. *La Scorzoneré laineuse.* G. *Wellige Haberw.* G. *Gyapjas ártifióla.* H.

In aridis montosis juxta Bonyha. Maj. Jun. P.

Obs. Folia utrinque et pedunculi cum anthodio la-ba densa molli niveaque obducti,