

N.º 3975. *Hieracium scariolaceum* AT. = *H. violetianum* in sched., non Jean. et Timb.

Hab.—Gérone: S. Feliu de Pallarols à Ntra. Sra. de la Salut, rochers à coté du Sanctuaire, vers 1000 m.

Note.—La plante que le regretté H. Sudre, compétent en la matière, nous avait déterminée *H. violetianum*, diffère complètement de celle-ci, que le cher ami Coste baptisait du même nom. Après un examen attentif qui nous a pris beaucoup de temps, comme bien d'autres, nous la rapprochons, pour le moins, de l'*H. scariolaceum* AT. A supposer qu'il y eût encore équivoque, on aurait toujours des matériaux d'étude pour des groupes difficiles où l'erreur est toujours possible, comme nous le voyons dans l'exemple cité, où deux botanistes éminents sont d'avis très différent au sujet d'une même plante.

N.º 4944. *Picridium tingitanum* Duf. var. *subacaule* Willk.

Note.—Aux pieds réduits-décombants, s'en trouvent mêlés de dressés, qui nous paraissent appartenir au *P. intermedium* F. Schultz var. *robustum* Willk.

N.º 3444. *Zollikoferia Jaumei* Senn. = *Launea Jaumei* ej. in Bull. Soc. franc., 1929.

Hab.—Tarragone: littoral à Salou, dans les sables maritimes des vignes de la plaine et des coteaux de la Presqu'île.

Barcelone: Dunes de Castelldefels.

N.º 50001. *Scorzonera latibracteata* Senn. et El.; st. *hispanica*.

'Caules crassi, in tertio inferiore foliosi; folia oblonga, lanceolata; pedunculus monobracteolatus usque ad 5 cent. longus; ligulæ profunde sulcatæ, 2 cent. ad finem antheseos.

Tiges-épaisses-brunes-subsillonnées-vergetées, feuillées dans le $\frac{1}{3}$ inférieur, 1-2-céphales; feuilles oblongues-lancéolées-longuement acuminées, ondulées-erodées sur les bords épaissis; pétiole-ailé-engainant; les caulinaires moyennes sessiles-étroites-oblongues; pédicelle-mono-bractéolé-long-robuste, épaissi sous la calathide, pouvant atteindre 5 cent. de haut à l'anthèse, cylindrique, un peu atténuée sur le pédoncule; bractées extérieures du péri-cline 3-4, courtes-acuminées-étalées, très larges, 9-10 mill., les intérieures finement veinées de brun, encore plus larges et très longues, dépassant la laine roussâtre des aigrettes, lanugineuses sur les bords, la page intérieure et même à l'extérieur des pointes les plus allongées; ligules profondément sillonnées-anguleuses-dépassant longuement les aigrettes, mesurant environ 2 cent. sur la fin de l'anthèse.

Hab.—Logroño: Fonca, marges herbeuses.

Leg. Hno. Elías.

N.º 5000. *Scorzonera affinis* Senn. et El.; st. **humilis**.

Caules longi; internodii longi, pauci; folia radicalia externa brevia, sequentia longissima, fere 20 cent.; pedunculi minute bracteolati, periclinium cylindricum, 3-3 $\frac{1}{2}$ cent. ad finem antheseos, flavescens.

Tiges longues subépaisses-paucifoliées?striées-sub-anguleuses-sillonnées, aranéuses jusqu'à la base des calathides; entrenœuds longs, peu nombreux; feuilles radicales extérieures courtes, largement engainantes, les suivantes très longues, 20 cent. environ, étroites-ner-vées-aiguës; les caulinaires-sessiles-étroites-rares; pédon-cules finement bractéolés, épaissis sous le réceptacle; pé-ricline cylindrique assez long, 3-3 $\frac{1}{2}$ cent. à la fin de l'anthèse, flavescens; bractées extérieures lancéolées-aiguës, lanugineuses à la base; les intérieures longue-ment linéaires, luisantes, à bords scarioux.