

faciem, folia et capitulorum magnitudinem praesertim *Sc. tuberosae* Pall. simillima, sed ab ea eximie distincta capitulis cylindricis nec brevibus subrotundis.

Obs. *Podospermum villosum* Stev. *Sc. villosa* M. B. non Scop. est species in toto Oriente ab Atticâ per *Asiam minorem*, provincias *Caucasicas*, *Russiam meridionalem* et *Persiam australem* (Kotschy) late sparsa et cui adnumerandae sunt: *Sc. calvescens*, *Szowitsii*, *velutina* et *Astracanicæ* DC. *Sc. undulata* DC. Prod. quoad plantam Orientalem probabilissime quoque *Sc. araneosa* Sibth. *Pod. molle* Fisch. et M. *Sc. mollis* M. B. vix differt foliis strictis erectis non undulatis et probabiliter est quoque varietas hujus speciei.

SCORZONERA LIMNOPHILA Boiss. loc. cit. Febr. 1845. (Sect. *Gelosia* DC.)

*Sc. glaberrima*, radice tuberosâ ovatâ crassâ, foliis omnibus radicalibus humi expansis linearibus brevibus viridibus nervo medio albido instructis, pedunculis unifloris foliolo ad medium instructis monocephalis basi ascendentibus foliis paulo longioribus, capitulis cylindricis paucifloris involucri squamis paucis, inferioribus ovato-rotundis, interioribus lanceolatis obtusis triplo longioribus, flosculis marginalibus extus purpurascensibus caeterum luteis involucrum superantibus, acheniis erostatis marginalibus oblongo-compressis secus strias muriculatis interioribus breviter cylindricis angulatis laevibus, pappi sordide albi achenium subaequantis setis acheniorum marginalium plumosis, interiorum caducis vix plumosis scabridis.

Hab. in paludosis alpinis *Persiae australis* ad fontem *Dcheschme Pias* montis *Kuh-Daëna* Kotschy No. 737.

Folia sesquipollicaria 2 lineas lata, scapi 2-3 pollicares, magnitudo capitulorum et habitus *Sc. pygmaeae*, quae caeterum longe differt rhizomate crasso caespitose, squamarum involucri forma DC.

Obs. *Sc. elata* Boiss. diagn. No. 4. *Sc. strictae* Hornem. appropinquanda est et ei forsitan nimium affinis praesertim ejus varietas angustifolia quae a planta Rossica tantum differt collo radicis nudo, glabritie et involucri squamis longe attenuato-acuminatis.

SCORZONERA ISPAHANICA Boiss. (Sect. *Lasiospora* DC.)

*Sc. tota dense lana floccosa demum secedenti obsita*, caule simplici inferne folioso superne elongato-paniculato, foliis oblongo-lanceolatis