

31. *S. MACROCEPHALA*, glabra, caule erecto tereti subsimplici folioso apice aphylo, foliis confertis sessilibus linearibus integerrimis apice ferè subulatis acutis, capitulis 1-2 longè pedunculatis ovatis grossis, invol. squamis imbricatis obtusiusculis. (2)? in totâ ferè Hispaniâ frequens, et spec. in regno Valentino (Lag.), in dumetis et ad margines agrorum à Malaga ad alt. 5000 ped. in Sierra Nevada (Boiss.). *S. graminifolia* Lag. in litt. *S. graminifolia* Lusitanica Linn. sp. 791? excl. Sibir. *S. Lusitanica* gramineo folio, etc. Tourn. inst. 477? Radix gracilis simplex. Capit. 2 pollic. longum, pollicem et ultra latum. Flores flavi. (v. s.)
32. *S. RADIATA* (Fisch. in litt. Ledeb. fl. alt. 4. p. 160), radice oblongo-cylindraceâ, caule erecto simplici subnudo monocephalo, foliis oblongo-linearibus acuminatis nervosis planis, invol. squamis ovato-lanceolatis demùm glabris, cor. exterioribus elongatis invol. duplò longioribus radium mentientibus. 2 in pratis montanis Sibiricæ Altaicæ et Daburicæ (Fisch.) et in Chinâ boreali (Bunge). Caulis junior plus minus tomentosus, adultus glaber. Flores lutei. — Gmel. sib. 2. p. 2. n. 1. t. 1. (v. s.)
ℓ. linearifolia, foliis angustè linearibus, caule involuacroque magis tomentosus. 2 in Chinâ boreali. Bunge! enum. pl. chin. n. 331. (v. s.)
33. *S. STRICTA* (Horn. h. hafn. (1813) 2. p. 750. Bieb. suppl. p. 522), caule stricto simplici tereti apice striato, foliis basi lanceolato-linearibus apice summisque subulatis 3-5-nerviis integerrimis, junioribus cauleque villosis, adultis glabris, capitulis 1-3 ramulos nudos terminantibus, invol. squamis exterioribus villosis acuminato-subulatis demùm calvescentibus. — in campestribus apricis siccis ad Wolgam infer. et ad Rhynum (Bieb.), in agro Chersonensî (Beaupr.) in deserto Songoro-Khirsico (Ledeb.). *S. villosa* Bieb. fl. taur. n. 1569. excl. syn. *S. tomentosa* Siev. ex Ledeb. fl. alt. 4. p. 163. Capit. magn. et forma *S. Hispanicæ*, ligulis luteis, ext. subtus purpurascens ex Bieb. (v. s.)
34. *S. HALOPHILA* (Fisch. et Mey. pl. Szow. ined.), glaberrima, radice apice squamosâ, foliis radicalibus planis oblongo-linearibus linearibusve integerrimis acutis, caulibus scapiseve erectis simplicissimis 1-cephalis subaphyllis folia duplò superantibus, invol. floribus brevioribus, squamis lato-lanceolatis, 2 in Persiæ distr. Khoi prov. Aderbeischan locis salis humidis ad Schabauli. — Buxb. cent. 2. t. 21? Affinis *S. caricifoliæ* et Austriacæ. Radix nunquam stuposa. (v. s. comm. à cl. auct.)
35. *S. PUBESCENS*, tota pube brevi confertâ sublanuginoso-pubescens, caule erecto basi folioso 1-cephalo, foliis erectis linearibus acutis, integerrimis, invol. oblongi squamis ovato-lanceolatis acuminatis. — in collibus Altaicis circâ Zmeof legit cl. Patrin! Folia 7-8 poll. longa, lineam lata. Capit. 9-10 lin. longum 10-12-florum. Cor. flavæ. (v. s. comm. ab amic. B. Delessert.)
36. *S. MOLLIS* (Bieb. suppl. p. 522), radice multicipiti, foliis lineari-subulatis carinatis lanuginoso-villosis, junioribus margine undulato-crispis, caule brevissimo folioso, pedunculis elongatis subcorymbosis involucribus lanuginoso-villosis, 2 in collibus apricis siccis Tauricæ Hook. bot. mag. t. 3027. *S. tomentosa* Pall. itin. 3. p. 513, etc. non Linn. Folia adulta subglabrata, caulis longitudo. æquantia. Invol. squamæ exteriores ferè inter. æquantes. Cor. luteæ subtus purpurascens. An fortè ex Stev. Podospermi spec.? (v. s.)
ℓ. leptophylla, radice ad collum tuberosâ globosâ, foliis lineari-subulatis glabris, caule 1-2-cephalo foliis multò brevioribus cano-tomentoso, inv. squamis margine tomentosus, exter. brevioribus. 2 in prov. Aderbeischan Persiæ circâ Deliman in collibus argillosis legit cl. Szowitz. *S. mollis* Fisch. et Mey. pl. Szow. ined. An species propria? (v. s.)
37. *S. TOMENTOSA* (Linn. sp. 1112), tota tomentosa, caule recto simplici, foliis ovatis nervosis sessilibus integerrimis, ramulis floridis axillaribus vix folio longioribus, bracteis lanceolatis. 2 in Armeniâ. *S. Orient*, latifolia, etc. Tourn. cor. 36. Color. flor. ign.