

culis acuminatis.  $\frac{1}{2}$  in Hispaniâ (Claus.) ubi contra viperarum ictus olim usitata, in Thuringiâ (Wallr.) Blackw. herb. t. 406. Lam. Ill. 647. f. 5. S. denticulata Lam. fl. fr. v. p. 82. S. sativa Gater. fl. mont. 156. — Claus. hist. a. p. 137. f. 1. opt. — in hortis culinaris vulgò culta ob radicem edulem. (v. v. et s.)

$\beta$ . *crispata*, foliis ad margines crispato-dentatis.  $\frac{1}{2}$  in Hispaniâ prov. Malaga in Sierra Mijar et Bonda legit cl. Edm. Boissier. (v. s. à cl. inv.)

25. S. TAURICA (Bieb. fl. taur. n. 1558 et suppl.), pubescens, caule erecto folioso polycephalo, foliis inferioribus lanceolatis integerrimis acuminatis, super. linearisubulatis, invol. squamis acuminatis margine subtomentosis.  $\frac{1}{2}$  in Tauris et Bessarabiâ collibus aridis. Affinis S. Hispanicæ sed pubes vaga subtomentosa, ramî præter peduncululos laterales nulli, invol. brevius, etc. Variat ex Bieb. lanugine minus conescente cirtâ Borysthensium et angustifolia sub-1-cephala ad Nartianam. (v. s.)

26. S. MACROSTEMA (Turcz. l in litt. 1833), glabra, caule erecto tereti fistuloso folioso, foliis elongatis lanceolatis plurinerviis semiamplexicaulis integerrimis, capitulis 4-5 corymbosis pedicellatis, invol. squamis exter. ovatis brevibus, inter. lanceolatis elongatis, acheniis elongatis.  $\frac{1}{2}$  in Dahuria herbosa propè Nerzinskoi-Savod et ad flumen Schitka detexit cl. Turczaninow. Habitu mediâ inter Hispanicam et glastifoliam. Ab omnibus differt acheniis ultrâ semen longè producto et quasi rostrato styli basi persistente mucronato. An sectio propria? (v. s. comun. à cl. inv.)

27. S. GLASTIFOLIA (Willd. sp. 3. p. 1499. Richb. fl. exc. t. p. 776), radice subcylindraceâ, caule ramoso, ramis apice 1-cephalis, foliis ovali-lanceolatis basi duplexicaulis planis acutis glabris, invol. oblongi squamis glabris acuminatis, acheniis juniore subpubero.  $\frac{1}{2}$  in collibus Thuringiæ (Wallr.), Germaniæ, Bohemiæ, Silesiæ (Willd.), Pedemontii? (Gand.), Galliæ australis (Benth.). S. Hispanicæ  $\beta$ . Wallr. fl. hal. suppl. 3. p. 94. S. edulis Monch meth. 548. Valde S. Hispanicæ affinis et potius var.? (v. v. et s.)

$\beta$ . *aphodeloides* (Wallr. l fl. hal. suppl. 3. p. 94), foliis linearibus acuminatis strictis carinatis basi vaginantibus.  $\frac{1}{2}$  in Germaniâ. S. graminifolia Hoffm. fl. perm. 372. S. angustifolia Wahl. ex Wallr. An potius S. montanæ var.? (v. s.)

28. S. MONTANA (Mutel fl. Dauph. p. 168), radice cylindraceâ superne nudâ, caule simplici sut subramoso parè lanuginoso, foliis lineari-lanceolatis basi attenuatis subcarinatis apice acuminatis hinc inde sublanuginosis, invol. ovato-oblongi squamis 10-12 glabris lanceolatis, exter. brevioribus.  $\frac{1}{2}$  in pratis montanis Delphinatûs (Mutel) et Sabaudis (Bonjean l). Proximè accedit ad S. glastifoliam var.  $\beta$ . sed lanugine caulis et fol. infer. differt? (v. s.)

$\beta$ . *Basis* (Boiss. l ined.), foliis et invol. squamis angustioribus.  $\frac{1}{2}$  inter diemata cirtâ Esteponam Hispanorum legit cl. E. Boissier. (v. s. comun. à cl. inv.)

29. S. PARVIFLORA (Jacq. austr. 4. t. 305. Ledeb. fl. alt. 4. p. 161), glabra, collo multicipiti nudo, caule adscendente folioso 1-4-cephalo, foliis lineari-lanceolatis subensiformibus integerrimis acuminatis basi attenuatis, invol. cylindrici squamis lanceolatis, int. elongatis, ext. subbracteiformibus, ligulis vix expansis. Invol. parò longioribus, acheniis levibus.  $\frac{1}{2}$  in humidis sublimosis subalpis in Hungariâ ad lacum Neuedl (DC. l), in Gallis littoribus Mediterraneâ (Benth.), in Sibiria Altaica (Des. l) deserto Noryn et ad Salinas Irackenses (Pall.), ad Tanaim (Stev. l), in deserto Songoro-Khirsico (Ledeb.). S. caricifolia Pall. itin. 3. app. n. 131. t. II. ed gall. app. n. 39t. t. 99. f. 1. Folia 7-8 poll. longa, 4 lin. lata. (v. v. et s.)

30. S. STYPHALONIDES, glabra erecta, caule parè ramoso folioso, foliis lato-linearibus apice callosis rigidulis integerrimis, super. basi dilatatis, invol. glabro imâ basi tomentoso, squamis acuminatis subpatulis ligulis subæquantibus.  $\frac{1}{2}$  cirtâ Aleppum legit cl. Aucher l S. graminifolia Auch. l pl. ex. n. 3533 non Linn. Species insignis ob capitula expansa nec cylindracea, Stophthalmum sticifolium foliis et habitu capituli referens. (v. s. comun. à cl. inv.)