

Fl. jaunes, P. De la région basse de Modon et d'Arcadia, jusques à Messène.

*Obs.* 1. La figure de Buxbaum, citée par Linné même, représente fort bien notre plante, tandis que celle de Jacquin, offrant des feuilles jusqu'au-dessous des calyces, se rapporte plutôt au *S. pinifolia* Gouan, qu'à notre espèce.

*Obs.* 2. Les petits individus de cette plante, qui ont des feuilles très-étroites et sont uniflores, ressemblent au *S. hirsuta* L.; mais les feuilles n'en sont point striées comme dans cette espèce. Ceux qui sont ramifiés et grands ont leurs fleurs absolument pareilles à celles du *S. hispanica*; mais les feuilles, bien plus étroites, sont carénées, entières, et n'offrent point des nervures aussi prononcées.

La plante est d'ailleurs plus grêle et moins élevée.

- \*1083 SCORZONERA MESSENIACA Bory et Chaub. Pl. XXVIII, fig. 1. — Pedalis basi tantum ramosa: Foliis subinterrupte pinnatis pinnulis lanceolato-linearibus, extrema triplo longiore: Ramis submonophyllis apice primum tomentoso-incanis: Pedunculo nudo squamis destituto: Calycinis foliolis anguste lanceolatis (*scorz. humilis*) tomentosis semipatulis medium corollæ tantum attingentibus. ¶ — *S. laciniata* Sibth. et Sm. Prod. n.° 1885? — Spreng. Syst. 3, p. 668?

Fl. jaunes, P. E. La région maritime de Pylos à Arcadia.

Desc. *Radix* crassa fusiformis. *Caules* caespitosi erectiusculi subpedales basi tantum ramosi et tomento deciduo vestiti. *Folia* subinterrupte pinnata pinnulis lanceolato-linearibus in petiolum quandoque decurrentibus extima triplo longiore sed vix latiore. *Rami* unum alterumve folium lineare integrum infra medium gerentes, apice primum incanotomentosi mox nudi squamis destituti. *Calycinæ squamæ* lanceolatæ apice truncatæ semipatule *S. humilis* magnitudine formaque pene similes, pube caduca primum operatæ, *Corollulæ* calycem duplo superantes luteæ. *Pappus* plumosus. *Semina* matura ignota.

*Obs.* *S. humilis* affinis flore quânavis diversissima caule basi ramoso foliisque pinnatis. Affinis quoque *S. laciniata* L., foliis et caule cum sit diversissima calycis foliolis angustioribus brevioribusque et corolla calyce duplo longiora nec breviora.

- 1084 SONCHUS PALUSTRIS L. *Sp.* 1116. — Radice perenni repente: Caule orgiali: Foliis runcinatis subpinnatifidis denticulato-spinosis basi auriculato-sagittatis amplexicaulibus: Pedunculis corymbosis calycibusque glanduloso-hispidis corollis amplis calyce magno duplo longioribus: Seminum costatis transversim tenuissime striatis. ¶ — Curt. Lond. 5, t. 59. — Clus. Hist. 2, p. 147.

Fl. jaunes, E. L'Élide, selon Sibthorp (Prod. n.° 1887).

- 1085 SONCHUS PICRIOIDES Lam. *Encyc.* 3, p. 398. — Glaber ramosus: Foliis inferioribus lyrato-subpinnatifidis parce calloso-dentatis, superioribus subintegerrimis basi dilatatis amplexicaulibus: Pedunculis elongatis superne incrassatis squamatis: Calycinis foliolis exterioribus ovato-lanceolatis margine scariosis: Seminum costis gra-




Fig. 1. *Sargassum nigricans* (Kütz.) & Chamb. Fig. 2. *Sargassum pectinatum* (Kütz.) & Chamb.