

- culis acuminatis. \mathcal{U} in Hispaniâ (Clus.) ubi contrâ viperarum ictus olim usitata, in Thuringiâ (Wallr.) Blackw. herb. t. 406. Lam. ill. 647. f. 5. S. denticulata Lam. fl. fr. 2. p. 82. S. sativa Gater, fl. mont. 156. — Clus. hist. 2. p. 137. f. 1. opt. — in hortis culinariis vulgò culta ob radicem edulem. (v. v. et s.)
- $\beta.$ *crispatula*, foliis ad margines crispato-dentalis. \mathcal{U} in Hispaniæ prov. Malaga in Sierra Mijar et Bonda legit cl. Edm. Boissier. (v. s. à cl. inv.)
25. *S. TAURICA* (Bieb. fl. taur. n. 1558 et suppl.), præbescens, caule erecto folioso polycephalo, foliis inferioribus lanceolatis integerrimis acuminatis, super. linearis-subulatis, invol. squamis acuminatis margine subtomentosis. \mathcal{U} in Tauriæ et Bessarabiæ collibus aridis. Affinis *S. Hispánica* sed pubes vaga subtomentosa, rami præter pedunculos laterales nulli, invol. brevius, etc. Variat ex Bieb. lanugine minus canescente circa Borysíhenem et angustifolia sub-icephala ad Nartsanam. (v. s.)
26. *S. MACROSPERMA* (Turecz.! in litt. 1833), glabra, caule erecto tereti fistuloso folioso, foliis elongatis lanceolatis plurinerviis semiamplexicanilibus integerimis, capitulis 4-5 corymbosis pedicellatis, invol. squamis exter. ovatis brevibus, inter. lanceolatis elongatis, achæniis elongatis. \mathcal{U} in Dahuriæ herbosis propè Nerczinskoi-Savod et ad flumen Schitka detexit cl. Turezaninow. Habitu media inter Hispánicam et glastifoliam. Ab omnibus differt achænio ultrâ semen longè producto et quasi rostrato styli basi persistente mucronato. An sectio propria? (v. s. comm. à cl. inv.)
27. *S. GLASTIFOLIA* (Willd. sp. 3. p. 1499. Reichb. fl. exc. i. p. 276), radice subcylindraceâ, caule ramoso, ramis apice 1-cephalis, foliis ovali-lanceolatis basi amplexicanilibus planis acutis glabris, invol. oblongi squamis glabris acuminatis, achænio juniore subpubero. \mathcal{U} in collibus Thuringiæ (Wallr.), Germaniæ, Bohemiæ, Silesiæ (Willd.), Pedemontii? (Gaud.), Galliæ australis (Benth.). *S. Hispánica* $\beta.$ Wallr. fl. hal. suppl. 3 p. 94. *S. edulis* Mœnch meth. 548. Valde *S. Hispánica* affinis et potius var.? (v. v. et s.)
- $\beta.$ *aspodeloides* (Wallr.! fl. hal. suppl. 3. p. 94), foliis linearibus acuminatis strictis carinatis basi vaginantibus. \mathcal{U} in Germaniæ. *S. graminifolia* Hoffm. fl. germ. 272. *S. angustifolia* Wahl. ex Wallr. An potius *S. montanae* var.? (v. s.)
28. *S. MONTANA* (Mutel fl. dauph. p. 268), radice cylindraceâ supernè nudâ, caule simplici aut subramoso parcè lanuginoso, foliis linear-lanceolatis basi attenuatis subcarinatis apice acuminatis hinc indè sublanuginosis, invol. ovato-oblongi squamis 10-12 glabris lanceolatis, exter. brevioribus. \mathcal{U} in pratis montanis Delphinatûs (Mutel) et Sabandiae (Bonjean!). Proximè accedit ad *S. glastifoliam* var. $\beta.$ sed lanugine caulinis et fol. infer. differt? (v. s.)
- $\beta.$ *Bætica* (Boiss.! ined.), foliis et invol. squamis angustioribus. \mathcal{U} inter du meta circa Esteponam Hispanorum legit cl. E. Boissier. (v. s. comm. à cl. inv.)
29. *S. PARVIFLORA* (Jacq. austr. 4. t. 305. Ledeb. fl. alt. 4. p. 161), glabra, collo multicipiti nudo, caule adscendente folioso 1-4-cephalo, foliis linear-lanceolatis subensiformibus integerrimis acuminatis basi attenuatis, invol. cylindrici squamis lanceolatis, int. elongatis, ext. subbracteiformibus, ligulis vix expansis. invol. paullò longioribus, achæniis lœvibus. \mathcal{U} in humidis sublimosis subsalsis in Hungariâ ad lacum Nénsiedl (DC.!), in Galliæ littoribus Mediterraneanis (Benth.), in Sibiria Altaicae (Bess.!) deserto Noryn et ad Salinas Ilezkienses (Pall.), ad Tanaium (Stev.!), in deserto Songoro-Khîrgisico (Lebech.). *S. caricifolia* Pall. itin. 3. app. n. 131. t. Ji. ed gall. app. n. 391. t. 99. f. 1. Folia 7-8 poll. longa, 4 lin. lata. (v. v. et s.)
30. *S. BUPHTHALMORDIS*, glabra erecta, caule parcè ramoso folioso, foliis latolinearibus apice callosis rigidulis integrerimis, super. basi dilatatis, invol. glabro imâ basi tomentoso, squamis acuminatis subpatulis ligulas subæquantibus. \mathcal{U} circa Aleppum legit cl. Aucher! *S. graminifolia* Auch. pl. exs. n. 3533 non Linn. Species insignis ob capitula expansa nec cylindracea, Buphthalmum salicifolium foliis et habitu capituli referens. (v. s. commun. à cl. inv.)