

78. Cette plante croît dans les lieux stériles des provinces méridionales.

I V. Feuilles, calice & semences non ciliées.

Scorfonnère subulée. *Scorzonera subulata*.

*Scorzonera angustifolia prima*. Tournef. 476.

*Scorzonera angustifolia*. Lin. Sp. 1113.

Sa tige est simple, haute à peine d'un demi-pied, légèrement cotonneuse & abondamment garnie de feuilles très-étroites & en alène. Elle se termine par une seule fleur fort grande, de couleur jaune & un peu purpurine extérieurement; le péduncule est cotonneux & renflé près de la fleur. Cette plante croît dans les pâturages & sur les collines. ♂

V. Feuilles lancéolées, & dont la largeur excède six lignes.

Feuilles très-entières; tige presque simple & uniflore.

V I.

Feuilles denticulées; tige rameuse & pluriflore.

V I I.

V I. Feuilles très-entières; tige presque simple & uniflore.

Scorfonnère nerveuse. *Scorzonera nervosa*.

*Scorzonera latifolia humilis nervosa*. Tournef. 476.

β. *Scorzonera palustris pulveriflora*. Ibid. 477.

Sa tige est haute d'un pied, un peu velue & ordinairement simple; elle porte à son sommet une fleur assez grande & de couleur jaune: ses feuilles inférieures sont lancéolées, planes, élargies dans leur milieu & marquées de nervures comme celles du plantain. La variété β, dont la tige est garnie de deux ou trois feuilles un peu étroites, croît dans les environs de Paris, & la première ne se trouve que dans les provinces méridionales. ♀