

Scorzonera refedifolia. *Retz. obs: 3: p. 42. **

S. orientalis foliis calcitrapae flore flavescente. *Tournef. cor. 36.*

S. pratensis foliis laciniatis glabris. *Buxb. cent. 2. p. 27. t. 22. -*

Tragopogon refedae minoris folio lupinum. *Barr. ic. 800.*

Leyerblättrige Haberwurz. W.

Habitat in Africa boreali, Oriente. 2. (v. f.)

24. SCORZONERA *laciniata.*

S. foliis inferioribus pinnatifidis linearibus, superioribus linearibus, calycibus glabris, squamis inferioribus patulis mucronatis. W.

S. foliis linearibus dentatis acutis, caule erecto, calycum squamis patulo-mucronatis. *Sp. pl. 1114. Roy. lugdb. 120. Hort. upf. 242. Dalib. par. 242. Gouan. monsp. 406. Pollich. pal. n. 734. Mill. dict. n. 6. Jacq. austr. t. 356. Scholl. barb. n. 630. Hoffm. germ. 273. Roth. germ. I. 335. II. 251.*

S. caule folioso, ramofo, foliis angustissimis, imis rarer semipinnatis, superioribus linearibus lanceolatis. *Hall. helv. n. 12.*

S. foliis laciniatis. *Tournef. inst. 477. Gouan. monsp. 692.*

Tragopogon laciniatum luteum. *Bauh. pin. 274. Raj. hist. 251.*

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 9. p. 16.

Zerschlitze Haberwurz. W.

Habitat in Germania, Gallia. ♂ (v. v.)

Caulis erectus. Calycis squamae infra apicem mucronatae.

*25. SCORZONERA *octangularis.*

S. foliis inferioribus decursive pinnatifidis lanceolatis, superioribus lineari-lanceolatis, calycibus inapertis octangularibus. W.

Scorzonera octangularis. *Hortalan.*

S. (refedifolia) caule diffuso lanato, foliis hastato-pinnatifidis, caulinis integerrimis linearibus, calycibus tomentosis. *Gouan. illustr. 53?*

Achteckige Haberwurz. W.

Habitat in Europa australi. ♂ (v. f.)

Similis praecedenti sed folia radicalia latiora, laciniæ lanceolatae decurrentes et calyces canescentes ante anthesin octangulares. Gouani planta huc pertinere videtur, licet descriptio praecipue respectu caulis, qui in nostra erectus, discrepet. W.

* 26. SCORZONERA *pumila.*

S. foliis pinnatifidis acutis glabris, scapo squamoso glabro unifloro. W.

S. acaulis, foliis pinnatis, pinnulis linearibus glabris apicibus albis. *Cavan. ic. 2. p. 19. t. 121. f. 2. **

Kleine Haberwurz. W.

Habitat in Hispania. ☉

Folia pinnatifida glabra, laciniis linearibus acutis apice calloso-mucronatis. Scapus uniflorus squamis lanceolatis sparsis tectus. W.

* 27. SCORZONERA *coronopifolia.*

S. foliis pinnatifidis dentatis obtusis pubescentibus, scapo subaphyllo nudo tomentoso unifloro. W.

S. (*coronopifolia*) foliis pinnatifido-laciniatis pubescentibus, caule subnudo simplici unifloro. *Desf. atl. 2. p. 220. t. 212. **

S. (*brevicaulis*) foliis integris pinnatifidisque, caule tomentoso subaphyllo. *Vahl. symb. 2. p. 88. t. 44. **

Kurzstielige Haberwurz. W.

Habitat in montibus Barbariae. 24

28. SCORZONERA *orientalis.*

S. foliis sinuatis denticulatis acutis, caulibus subunifloris. *Sp. pl. 1113.*

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 9. p. 17.

Orientalische Haberwurz. W.

Habitat in Oriente. Hasselquist.

Folia profunde dentata, fere Leontodontis, margine denticulata, glabra. Caules breves, foliosi, subuniflori. Calyx squamis imbricatis: inferioribus, imprimis lateribus, margine late membranaceis: Corolla lutea, magnitudine S. humilis.

* 29. SCORZONERA *asperrima.* W.

S. foliis runcinatis hispida, caule subbifloro subfolioso hispido. W.

Lin. Sp. Pl. Tom. III. P. III.

C