

POLYGAMIA ÆQUALIS.

810. TRAGOPOGON. *Receptaculum nudum. Calyx simplex, polyphyllus. Pappus plumosus.*

- pratense.* 1. T. calycibus corollæ radium æquantibus, fol. integris strictis.
- orientale.* 2. T. calyc. corollæ radio brevioribus, fol. integris subundulatis.
- porrifolium.* 3. T. calyc. corollæ radio longioribus, fol. integris nudis, pedunc. superne incrassatis.
- crocifolium.* A. T. calyc. corollæ radio longioribus, fol. integris: radicalibus peduncalisque basi villosis.
- hybridæ.* 4. T. calyc. corollæ radio longioribus, fol. integris, seminibus lævibus: disci plumosis; radii setaceis.
- virginic.* 5. T. fol. radicalibus lyratis rotundatis, caulinis indivisis.
- dalechampii.* 6. T. calyc. corollæ brevioribus inermibus, fol. lyrato sinuatis.
- Picroides.* 7. T. calyc. corollæ brevioribus aculeatis, fol. pinnatohastatis.
- asperum.* 8. T. calyc. corollæ brevioribus hispida, fol. integris; caulinis oblongis.

811. SCORZONERA. *Recept. nudum. Pappus plumosus. Cal. imbricatus squamis margine membranaceis.*

- humilis.* 1. S. caul. subnudo unifloro, fol. nervosis planis.
- hispanica.* 2. S. caul. ramoso, fol. amplexicaulibus integris serrulatis.
- graminis.* 3. S. fol. lineari-ensiformibus integris carinatis.
- purpurea.* 4. S. fol. lineari-subulatis integris planis, pedunc. cylindricis.
- angustifolia.* 5. S. fol. subulatis integris, pedunc. incrassato, caule basi villosa.
- resedifol.* 6. S. fol. obtuse dentatis, caule prostrato, calyc. apice tomentosus. *Sp. pl.* 1189: 9.
- laciniata.* 7. S. fol. linearibus dentatis acutis, caul. erecto.
- oriental.* A. S. fol. sinuatis denticulatis acutis, caul. subunifloris.