

basi attenuatis obtusiusculis 5-7 nerviis, superioribus ad pedunculorum basin subulatis brevissimis, pedunculis incurvis capitulo subrotundo 3-plo longioribus flexuosis parce squamulosis, involucri glabri squamis omnibus acuminatis, exterioribus caeteris paulo tantum brevioribus, floribus luteis, acheniis

Hab. in Persia prope Ispahan Aucher No. 4897.

Planta sesquipedalis, caulis striatus gracilis, capitula illis *Sc. ensifoliae* et *paniculatae* dimidio minora. Ab eis praeter indumentum, folia tenera obsolete nervosa nec rigida nervosissima differt squamis exterioribus longe acuminatis interiores subaequantibus etc.

SCORZONERA PANICULATA Boiss. (Sect. *Lasiospora* DC.)

Sc. glabriuscula, caule elato valde folioso superne longe thyrsoideo-paniculato, foliis sessilibus, lanceolatis rigidis acuminatis sub 5 nerviis, nervis valde prominulis secus caulem decurrentibus margine subscabridis, superioribus ad ramorum basin lanceolato-linearibus breviter acuminatis, ramis squamulis linearibus auctis apice subincrassatis monocephalis, involucri glabri squamis omnibus acuminatis, inferioribus triplo brevioribus intimis flores luteos subaequantibus, ovariis villosis, pappi rufescentis setis parte inferiori plumosis superiori scabris.

Hab. in Kurdistania prope Diarbekir Kotschy in Mus. Imp. Vindob. No. 223.

Planta speciosa, cujus partem superiorem tantum vidi probabiliter 3-4 pedalis, folia plana fere tres pollices longa $\frac{1}{2}$ pollicem lata, panicula elongata strictiuscula pedalis, capitula illis *Sc. ensifoliae* paululum minora abs qua foliis multo latioribus nec longissime attenuato-subulatis inflorescentiaque ramosissima differt. *Sc. nervosa* Trevir. brevi diagnosi meae speciei valde affinis, ab ea differre videtur foliis ventricosolanceolatis multinerviis arachnoideis. *Sc. latifolia* quoque valde affinis differt indumento sericeo-tomentoso, foliis multinerviis margine crispulis, panicula depauperata etc.

SCORZONERA SUBAPHYLLA Boiss. loc. cit. Febr. 1845. (Sect. *Polyclada* DC.)

Sc. glaucescens, radice multicaulis collo lanuginoso, foliis breviter puberulis paucis radicalibus lineari-lanceolatis basi attenuatis rigidis acutiusculis, caulibus ramosissimis ramisque strictis erectis rigidis, foliis