

- t. 17. f. 4. S. trachysperma Guss. pl. rar. p. 319. t. 58. Cor. purpureæ. Pappi sete basi plumosæ apice simplices. Variat ex Guss. foliis pubescentibus à basi undulatis.
12. S. PAPPOSA, glabra, caule erecto ramoso, foliis margine crenato-undulatis oblongo-lanceolatis, summis linearibus integerrimis, capitulis longè pedicellatis oblongis, invol. squamis exter. latis subobtusis, achæniis tuberculato-echinulatis, pappi setis exter. densè et breviter barbato-plumosis confertis. ♀ in Syriâ ad Antab (olim Daba) legit cl. Aucher pl. exs. n. 4316! Cor. purpurascentes. Fructus ferè S. trachyspermæ, sed herba diversissima. (v. s. comm. à cl. inv.)
13. S. INCISA, caule erecto farinoso-pubescente parcè ramoso, foliis caulinis glabris oblongis acuminatis inciso-semipinnatifidis, infer. petiolatis, super. sessilibus semiamplexicanibus, invol. oblongi squamis exter. latis subobtusis, achæniis laevibus. — in Cappadociâ ad Euphratem legit cl. Aucher pl. exs. n. 3315! Cor. ex sicco purpurascentes. Capit. ferè S. papposæ. (v. s. comm. à cl. inv.)
14. S. PARADOXA (Fisch. et Mey. pl. Szow. ined.), floccoso-lanuginosa subglabra glauca, foliis integerrimis, radicalibus petiolatis ovatis acutis, caulinis lanceolatis subcordatis sessilibus, caulis subsimplicibus sub-1-cephalis, pedunculis apice incrassatis, invol. squamis biseriatis ovatis, exterioribus multò brevioribus. — inter fragmenta lapidum ad lacum Ormiah in prov. Persiae Aderbeishan. Flores purpurei.

** *Floribus flavis.*a. *Foliis subdentatis aut integris.*

15. S. ANGUSTIFOLIA (Linn. sp. 1113), radice cylindracea ad collum nudâ, caule 1-cephalo squamis linearibus tecto apice subincrassato et lanuginoso aut glabro, foliis infer. sessilibus linearibus subtrinerviis glabris, invol. ovali-oblongi squamis elongatis lanceolatis, achæniis striatis laevibus. ♀ in montosis Helvetiæ, collibus et planitiibus Galliæ in Burgundiâ, Lozerâ, Gallo-provinciâ, Vasconia subulosis, in Italiâ boreali, Dalmatiâ, etc. Gand! fl. helv. 5. p. 19. DC. fl. fr. n. 2980. Affinis hinc S. plantagineæ, illinc tenuifoliae. Synonymia intricata. Icones Gmelini et Kitaibelii ad alteras species referenda. Variat scapo apice lanuginoso. (v. v. et s.)
16. S. PLANTAGINEA (Schleich. pl. exs. Gaud. fl. helv. 5. p. 20), radice cylindracea apice nudâ, caule paucifolio 1-cephalo apice lanuginoso aut demùm glabro, foliis infer. petiolatis lato-lanceolatis 5-nerviis apice subcalloso acuminatis, invol. ovali-cylindrici squamis lanceolatis subobtusis floribus dimidiò brevioribus, achæniis striatis laevibus. ♀ in pratis humidis nemoribus montanis Helvetiæ, Germaniæ, Galliæ. S. humilis Willd. sp. 3. p. 1499. excl. Clus. syn. Horn. fl. dan. t. 1653. S. glastifolia Heg. helv. 2. p. 157. S. nervosa & Poir. dict. 7. p. 22. (v. v. et s.)
17. S. SEMICANA, radice cylindracea carnosâ, caule erecto folioso polycephalo apice præsertim pedicellisque cano-subtomentosis, foliis lanceolatis antheseos tempore glabriusculis, invol. subcanescens erecti squamis latis adpressis, achæniis muricatis. ♀ in montibus Asiæ minoris propè Mardin legit cl. Aucher pl. exs. n. 3335! Radix esculenta. Folia inf. basi attenuata, super. sessilia semiamplexicaulia. Pedicelli nudi axillares folio longiores. Folia juniora vid. canescens, adulta glabra. Flor. flavi. (v. s. comm. à cl. inv.)
18. S. ARISTATA (Ramond in DC. fl. fr. 1805. v. 4. p. 922), glabra, radice cylindracea ad collum nudâ, foliis radicalibus linearisublanceolatis valde elongatis 3-5-nerviis integerrimis ad basin araneosis, caule 1-cephalo sub capitulo parcè lanuginoso, invol. ovati squamis exter. pluribus elongatis lâxis margine membranaceis, achæniis tuberculato-muricatis. ♀ in pratis alpinis Pyrenæorum locis dictis Pic d'Ereslids, Esquieri, etc. S. grandiflora Lapeyr. abr. (1813). 479 ex Benth. (v. v. et s.)
- ♀. *Alpina*, foliis caule dimidiò ferè brevioribus, invol. squamis à angusto-