

denticulato-papillosis a medio sursum lanuginoso-papposis, pappi setis planiusculis densissime et longe lanato-plumosis leucophæis.

Bei Nachitschewan am Fuss des Ilanglidagh, 21 Mai 1847 (florens et fructiferus).

N^o 307/5.

Planta bipollicaris, folia 1—1½ pollicaria, capitula 6—7 lineas longa. Achenia 2¼ lineas longa a parte dimidia sursum lana longa leucophæa in pappum abeunti obsita. Pappus achenio æpui longus. Stipes cavus brevis ad basin achenii ut in *Podospermo*. Species omnibus notis sectioni *Epilasiae* Bunge (in Lehm.) in genere *Scorzonera* subanomala adnumeranda. *Sc. intermedia* Bge. nostræ speciei affinis distinguitur foliis angustioribus lineari-oblongis acuminatis, involucri phyllis exterioribus interiora non æquantibus.

Scorzonera picridioides Boiss. Diagn. pl. or. VII. 6.

Ebene von Dschendak nahe den Bergen, 4 April 1849 (specimen unicum florens).

Zwischen Isfahan und Kaschan, Mai 1849 (fructifera). N^o 1238. Persisch: Bälgak.

Scorzonera calyculata Boiss. Diagn. XI. 24.

Albursgebirge im Larthal bei Churchurâ 8000 F. ü. d. M., 20 Juni 1848 (florens).

N^o 1060. 1076.

Scorzonera halophila Fisch. et Mey. DC. Prodr. VII. 122.

Salzbergwerk bei Nachitschewan, 11 Mai 1847 (fructifera).

Scorzonera persica n. sp.

Sc. (Euscorzonera) radice crassa nigricanti, caulibus pumilis adscendentibus foliosis simplicibus apice breviter nudo monocephalis cano-villosis, foliis confertis lanceolatis acutis valde undulatis trinerviis patulis adpresse cano-tomentosis, involucri phyllis adpresse hirsutis imbricatis lanceolatis acuminatis laxis, ligulis flavis involucri sesquolongioribus concoloribus, acheniis (junioribus) glabris, pappi setis numerosis inæqualibus parte inferiori dimidia plumosis rufescentibus.

Gebirge bei Mendschil, 26 Mai 1848 (specimen unicum florens). N^o 984.

Caules 2½ pollicares, folia numerosa 9—10 lineas longa 1½—½ lineas lata. Capitula magnitudine eorum *Sc. villosæ*. Species habitu sectionem *Gelasiam* referens, sed ab ea setis basi plumosis discedens prope *Sc. sericeam* Auch. collocanda.

Scorzonera cinerea Boiss. Diagn. pl. or. XI. 44.

Karadagh, Juli 1847 (fructifera). N^o 760/6.

Scorzonera ramosissima DC. Prodr. VII. 125.

Gebirge in N von Isfahan bei Ssou an einem felsigen Abhange, 21 Mai 1849 (fructifera). N^o 1428.

Scorzonera intricata Boiss. Diagn. pl. or. VII. 9.

Gebirge von Iesd, bei Mäswor, 4 Mai 1849 (florens). N^o 1410.