

## GENUS III. LEONTODON.

Char. Gener. *Receptaculum* nudum. *Cal.* imbricatus squamis laxiusculis. *Pappus* plumosus. Lin. fy. pl. G. 991.

† Sp. I. LEONTODON SINENSE. 1. 2. Pa. sum tsao. 2. Bo coung anh.  
Differ. spec. Leont. *Calyce* superne reflexo: *foliis* oblongis: inferne runcinatis.

Hab., & notæ. *Herba* annua, acaulis. *Folia* turbinato-oblonga, apice rotundata, integerrima: inferius runcinata, glabra, sessilia, in orbem expansa. *Pedunculi* 1-flori, longi, erecti, glabri. *Calyx* sub-erectus, squamis acutis, laxis, supremis reflexis. *Corolla* aurea, tota ligulata. *Receptaculum* nudum. *Pappus* pilosus.

Habitat incultum apud Sinas.

Virtus: Attenuans, Resolvens, Mundificans.

## GENUS IV. SCORZONERA.

Char. Gener. *Receptaculum* nudum. *Pappus* plumosus. *Calyx* imbricatus, squamis margine scariosis. Lin. fy. pl. G. 985.

† Sp. I. SCORZONERA PINNATIFIDA. 7. . . .  
Differ. spec. Scor. *foliis* pinnatifidis, semiamplexicaulibus: *panicula* diffusa, terminali.

Hab., & notæ. *Caulis* suffruticosus, erectus, debilis, 3-pedalis, ramosus. *Folia* pinnatifida, denticulata, crassa, glabra, semiamplexicaulia. *Flos* semiflosculosus, dilute luteus, panicula diffusa, terminata pedunculis sub-umbellatis. *Calyx* oblongus, imbricatus. *Receptaculum* nudum. *Pappus* plumosus.

Habitat spontanea in continenti Africae, Orientalis; prope Mozambicum.

## GENUS V. LACTUCA.

Char. Gener. *Receptaculum* nudum. *Calyx* imbricatus, cylindricus, margine membranaceo. *Pappus* simplex, stipitatus. *Semina* lævia. Lin. fy. pl. G. 988.

Sp. I. LACTUCA SATIVA. α. Rau diep tau. β. Yé tsai: Kiu.  
Differ. spec. Lact. *foliis* rotundatis, caulinis cordatis: *caule* corymbose. Lin. sp. 2.

Hab., & notæ. *Caulis* annuus, sesquipedalis, erectus, crassus, glaber, albicans, corymbose-ramosus. *Folia* turbinato-rotunda, plicata-