


сильноолиственные, несущие на коротких слабых веточках молодые бутоны в очертании шарообразные. Листья сизо-зеленые, узко-линейные (2—3 мм ширины), плоские, опушенные, с неясно выраженными нервами, по краю опоясаны хрящевидной полоской; стеблевые сидячие. Корзинки и семянки неизвестны. Судя по молодым бутонам, наружные листочки обертки треугольные, плоские.

Scorzonera Popovii Lipsch. sp. nova (ad interim); Rhizoma crassum caudicibus pluribus in caespites densos semiglobosos compositos edens. Caudices basi vaginis numerosissimis foliorum vetustorum pro maxima parte fissis densissime imbricatimque tecti. Vaginae ventre densissime lana alba vestitae. Caules numerosi, subflexuosi, subsulcati, dense foliiferi superne ramosi, rami alabastra ovata gerentes. Folia glauco-viridia, anguste linearia (2—3 mm lata), plana, pubescentia, nerviis subprominentibus, marginibus angustissime membranaceo marginatis; caulina sessilia. Capitula et achenia ignotae. Secundum analysin alabastrii juvenilis involucri phylla exteriora videntur plana triangulata non carinata.

Specimen unicūm atque valde incompletum, a me solum visum habitu specimina Scorzonerae tau-saghyz simillima quod ab autem foliorum forma, caulibus ramosioribus, capitulorum forma sat differt. Nonne S. pusillae magis affinis?

Spec. examin.: Montes Sultan-Uiz-dagh in sabulis Ksyi-kum, IV, 1913, M. G. Popov.

До получения более полного материала с корзинками и сеянками систематическое положение этого нового вида нам неясно, поэтому мы воздерживаемся от включения *Scorzonera Popovii* nov. в секцию *Infrasulares* и исключаем ее из ключа для определения видов этой секции.



Tab. 5. *Scorzonera Popovii* Lipsch. sp. nova (habitus; 1/2).