

сто назад обращенные, верхние обычно не шире боковых. Корзинки 8 мм шир. Листочки покрывала ланцетные, 6, или 7, опушенные. Цветки ярко-желтые, вдвое длиннее покрывала. М.—Сев.: Ствр. Тер. Даг. Гр.: Тиф. (сю) Аз.: Ган. (сю). Бак. (сю) Карабах Лнк. Ар.: Эр. Нах. Тур.: Артв. о. В нижней и средней горных зонах на сухих каменистых склонах.

5379. *P. sanum* C. A. M.

Стебли обычно крепкие, 20—40 см. выс., ветвистые, со многими корзинками. Листья с многочисленными боковыми и удлинённой узко-линейной верхушечной долей; все долики на верхушке с войлочным хохолком. Листочки покрывала ланцетные, на вершине слегка отогнутые и с белым хохолком. Цветки желтые. М.—Нах. На каменистых местах и в посевах.

5379 а. *P. persepolitatum* (Boiss.) Grossh.

Примечание. Виды рода *P.* на Кавказе почти совсем не изучены: Приведенная таблица представляет только схему для первоначальной ориентировки. *P. albigenum* несомненно разбивается на несколько рас, *P. laciniatum* и *P. calcitrapifolium* не вполне соответствуют европейским типам, настоящий *P. sanum* растет, по-видимому, только в Зуванте, в других местах Кавказа растут другие, еще не описанные расы.

Род 1010. SCORZONERA L.—КОЗЕЛЕЦ

Корзинки многоцветковые. Покрывало черепичатое. Цветоложе голое. Семянка линейно-цилиндрическая, кверху немного суженная, гранистая, при основании с углубленным рубчиком. Летучка из перистых, переплетающихся между собою неодинаковых волосков.

(Из свыше 100 видов, населяющих Европу, страны Средиземья, Переднюю и центральную Азию, у нас 23).

1. Семянки по всей длине густо волосистые 2.
- Семянки голые, иногда бугорчатые, но не волосистые 9.
2. Корень цилиндрический, на некоторой глубине клубневидно-утолщенный 3.
- Корень цилиндрический или веретеновидный, без утолщения 4.

3. Стебли более высокие, 10—20 см. выс., вместе с листьями густо бело-лохмато-пушистые. Листья сосредоточены у основания стеблей, линейно-ланцетные, извилистые, обычно вдвое короче стебля. Корзинки одиночные, 7—10 мм. шир. Листочки покрывала ланцетные, заостренные, наружные часто равны внутренним. Цветки лимонно-желтые, в полтора раза длиннее покрывала. Семянки обратно-конические, густо волосистые. Хохолок рыжеватый. М.—Сев.: Тер. Гр.: Кут. (с) Тиф. (сю) Аз.: Ган. (ю). В средней горной зоне на сухих склонах.

○ 5380. *S. lanata* M. B.

Стебли очень низкие, 3—6 (10) см. выс., при плодах дугообразно к земле прижатые, вместе с листьями густо беловато-серо-лохмато-пушистые. Листья линейные, у основания стебля в числе 4—8, извилистые, обычно равные стеблю. Листочки покрывала ланцетные. Цветки оранжево-желтые, снаружи красноватые, чуть длиннее покрывала. Семянка густо мохнато-бело-волосистая. Хохолок белый. М.—Ар.: Эр. (Беюк-Веди) Нах. В средней горной зоне на сухих склонах.

5381. *S. pseudolanata* Grossh.

4. Растение прижато бархатисто-пушистое, почти белое, реже оголенное и тогда листья зеленые, в нижней части как-бы с мучнистым