

31. *S. MACROCEPHALA*, glabra, caule erecto tereti subsimplici folioso apice aphylo, foliis confertis sessilibus linearibus integerrimis apice ferè subulatis acutis, capitulis 1-2 longè pedunculatis ovatis grossis, invol. squamis imbricatis obtusiusculis. (2)? in totâ ferè Hispaniâ frequens, et spec. in regno Valentino (Lag.), in dumetis et ad margines agrorum à Malaga ad alt. 5000 ped. in Sierra Nevada (Boiss.). *S. graminifolia* Lag. in litt. *S. graminifolia* Lusitanica Linn. sp. 791? excl. Sibir. *S. Lusitanica* gramineo folio, etc. Tourn. inst. 477? Radix gracilis simplex. Capit. 2 pollic. longum, pollicem et ultra latum. Flores flavi. (v. s.)
32. *S. RADIATA* (Fisch. in litt. Ledeb. fl. alt. 4. p. 160), radice oblongo-cylindraceâ, caule erecto simplici subnudo monocephalo, foliis oblongo-linearibus acuminatis nervosis planis, invol. squamis ovato-lanceolatis demùm glabris, cor. exterioribus elongatis invol. duplò longioribus radium mentientibus. 2 in pratis montanis Sibiricæ Altaicæ et Daburicæ (Fisch.) et in Chinâ boreali (Bunge). Caulis junior plus minus tomentosus, adultus glaber. Flores lutei. — Gmel. sib. 2. p. 2. n. 1. t. 1. (v. s.)  
*ℓ. linearifolia*, foliis angustè linearibus, caule involuacroque magis tomentosus. 2 in Chinâ boreali. Bunge! enum. pl. chin. n. 331. (v. s.)
33. *S. STRICTA* (Horn. h. hafn. (1813) 2. p. 750. Bieb. suppl. p. 522), caule stricto simplici tereti apice striato, foliis basi lanceolato-linearibus apice summisque subulatis 3-5-nerviis integerrimis, junioribus cauleque villosis, adultis glabris, capitulis 1-3 ramulos nudos terminantibus, invol. squamis exterioribus villosis acuminato-subulatis demùm calvescentibus. — in campestribus apricis siccis ad Wolgam infer. et ad Rhynum (Bieb.), in agro Chersonensî (Beaupr.) in deserto Songoro-Khirsico (Ledeb.). *S. villosa* Bieb. fl. taur. n. 1569. excl. syn. *S. tomentosa* Siev. ex Ledeb. fl. alt. 4. p. 163. Capit. magn. et forma *S. Hispanicæ*, ligulis luteis, ext. subtus purpurascensibus ex Bieb. (v. s.)
34. *S. HALOPHYLLA* (Fisch. et Mey. pl. Szow. ined.), glaberrima, radice apice squamosâ, foliis radicalibus planis oblongo-linearibus linearibusve integerrimis acutis, caulibus scapisque erectis simplicissimis 1-cephalis subaphyllis folia duplò superantibus, invol. floribus brevioribus, squamis lato-lanceolatis, 2 in Persiæ distr. Khoi prov. Aderbeischan locis salsis humidis ad Schabauli. — Buxb. cent. 2. t. 21? Affinis *S. caricifoliæ* et Austriacæ. Radix nunquam stuposa. (v. s. comm. à cl. auct.)
35. *S. PUBESCENS*, tota pube brevi confertâ sublanuginoso-pubescens, caule erecto basi folioso 1-cephalo, foliis erectis linearibus acutis, integerrimis, invol. oblongi squamis ovato-lanceolatis acuminatis. — in collibus Altaicis circâ Zmeof legit cl. Patrin! Folia 7-8 poll. longa, lineam lata. Capit. 9-10 lin. longum 10-12-florum. Cor. flavæ. (v. s. comm. ab amic. B. Delessert.)
36. *S. MOLLIS* (Bieb. suppl. p. 522), radice multicipiti, foliis lineari-subulatis carinatis lanuginoso-villosis, junioribus margine undulato-crispis, caule brevissimo folioso, pedunculis elongatis subcorymbosis involucribus lanuginoso-villosis, 2 in collibus apricis siccis Tauricæ bot. mag. t. 3027. *S. tomentosa* Pall. itin. 3. p. 513, etc. non Linn. Folia adulta subglabrata, caulis longitudo. æquantia. Invol. squamæ exteriores ferè inter. æquantes. Cor. luteæ subtus purpurascens. An fortè ex Stev. Podospermi spec.? (v. s.)  
*ℓ. leptophylla*, radice ad collum tuberosâ globosâ, foliis lineari-subulatis glabris, caule 1-2-cephalo foliis multò brevioribus cano-tomentoso, inv. squamis margine tomentosus, exter. brevioribus. 2 in prov. Aderbeischan Persiæ circâ Deliman in collibus argillosis legit cl. Szowitz. *S. mollis* Fisch. et Mey. pl. Szow. ined. An species propria? (v. s.)
37. *S. TOMENTOSA* (Linn. sp. 1112), tota tomentosa, caule recto simplici, foliis ovatis nervosis sessilibus integerrimis, ramulis floridis axillaribus vix folio longioribus, bracteis lanceolatis. 2 in Armeniâ. *S. Orient*, latifolia, etc. Tourn. cor. 36. Color. flor. ign.