

3. *Scorzonera pulchra* Lomakin.

(Sect. *Lasiospora* Less.—Boiss. Fl. Or. III, 756).

Perennis, tota alba arachnoideo tomentosa, radice crasso verticali, caulibus robustis elatis usque ad apicem foliosis, foliis infimis lanceolatis in petiolum attenuatis, caulinis late lanceolatis basi attenuata sessilibus, inflorescentia thyrsoideo corymbosa, pedunculis longis inferioribus folio 2—3 longioribus, 1 rarius 2—3 cephalis foliis lanceolatis instructis, folio supreme capitulo approximato, capitulis oblongis, phyllis dense arachnoideo tomentosis lineatis acuminatis, externis brevioribus longius acuminatis, flosculis luteis involucreo vix longioribus, acheniis (immat.) longe et dense lanatis, pappi rufescentis setis parte inferiore plumosis apice scabris.

Ab. affini *Sc. nervosa* Trevir. differt indumento copiosissimo, foliis latioribus, pedunculis longissimis foliis latis lanceolatis non linearī setaceis instructis.

Caucasus, Karabach, in fruticetis montis Ziarat, 5000—6000'. (Lomakin).

Многолѣтнее растеніе; всѣ части покрыты густымъ бѣлымъ паутинистымъ войлокомъ; стебли высокіе, крѣпкіе, до вершины облиственные; нижніе листья ланцетные, суженные въ черешокъ; стеблевые сидячіе, широко ланцетные, при основаніи суженные; соцвѣтіе—почти щитокъ, вслѣдствіе весьма большой длины нижнихъ цвѣтоножекъ (въ 2—3 раза длиннѣ листьевъ), снабженныхъ ланцетными листьями, изъ которыхъ верхній у самой головки; на каждой цвѣтоножкѣ 2—3 головки; головка продолговатая, листочки обертки линейные, приостренные; внѣшніе листочки короче и болѣе длинно приостренные; цвѣты желтые, едва длиннѣ обертки; сѣмянки (незр.) длинно и густо шерстистыя; волоски рыжеватой лелучки при основаніи перистые, на верху шероховатые.

Кавказъ, Карабахъ, среди кустарниковъ на горѣ Зіаратъ, 5000—6000', 16 іюня 1895 года, съ цвѣтами.

Отъ ближайшаго вида *Sc. nervosa* Trevir. наше растеніе отличается густымъ бѣлымъ войлокомъ, болѣе широкими листьями, очень длинными цвѣтоножками, снабженными довольно широкими, а не узколинейными листьями.
