

Scorzonera nervosa Trev. — Boiss. fl. Or. III, 779.

Kurdistan (Assyrien): Riwandus, am Berge Händarin (nahe der persischen Grenze), 1300 m (28. VII. 1893; no. 1514, *S. veratrifolia* Fenzl).

Echte *S. veratrifolia* Fenzl. (foliis caulinis basi cordatis) wurde in angrenzenden Gebieten neuerdings auch von N á b ě l ě k gesammelt. *Sc. nervosa* Trev. (foliis caulinis basi subattenuato-sessilibus) eine gleichfalls prächtige Art, besitzt die gleiche Tracht. Beide Arten sind auch im Indument voneinander verschieden.

Kurdistan (Assyrien): Lichtbewaldete Hänge des Kuh-Sefin bei Schaklava, 1000—1600 m (12. V. 1893, no. 1515).

Scorzonera ramosissima DC. — Boiss. fl. Or. III, 781. — var. *kermanaensis* Bornm. (pro spec. in exsicc.) caulibus numerosissimis quidem sed brevibus (semipedalibus) simplicibusque.

Südöstl. Persien: Prov. Kerman, Kerman, in höheren Lagen des Kuh-i-Sirdsch, 3400—3600 m (23. V. 1892; no. 5142) und Kuh-i-Dschupar, 2700 m (7. V. 1892; no. 5141).

Exemplare gleicher Art und ebenfalls niederen Wuchses, gesammelt von Strauß bei Sultanabad des westlichen mittleren Persiens, gehören zum Typus (Stengel verzweigt, mehrblütig).

Scorzonera nana Boiss. et Buhse. — Boiss. fl. Or. III, 782.

Südöstl. Persien: Prov. Kerman, am Kuh-i-tagħ-ali bei Kerman, 2000 m (11. V. 1892; no. 4132).

Mir begegneten von dieser bisher nur von zwei Fundstellen bekannten Art nur zwei kleine Individuen, über deren spezifischen Wert sich nichts sagen läßt. Wuchs niedrig; ganze Pflanze nur 3 cm hoch. Mit der ziemlich hochwüchsigen *S. hemilasia* Bge., die ich bei Patschinar in Gilan sammelte (no. 7574), liegt wenig Ähnlichkeit vor. Bei Kerman wurde *S. nana* Boiss. bereits von Bunge gesammelt.

*Taraxacum*¹⁾ *primigenium* H. M. p. 17. — Syn. *T. Assemani* Boiss. fl. Or. III, 791 p. p.; non Blanche.

Südöstl. Persien: Prov. Kerman, feuchte hochalpine Plätze des Kuh-i-Lalesar, 3500—3900 m (15. VII. 1892; no. 5131) als *T. Assemani* Boiss.), zusammen mit *Pinnula capitellata*, *Parnassia Bornmülleri*, *Calamagrostis olympica*, *Pedicularis lalesarensis*, *Crepis heterotricha*, *Potentilla nuda*, *Trachydium depressum*, *Zozimia suffruticosa* usw.

Taraxacum Wallichii DC. — H. M. p. 42—43. — Syn. *T. lobulatum* Hsckn. et Bornm. (in exsicc.).

Südöstl. Persien: Prov. Yesd, bei Artekan, 1500 m (29. III. 1892; no. 5135); zwischen Yesd und Taft in einem Dorfgraben, 1800 m; ebenda bei 1600 m auf Hügeln (4. IV. 1892;

¹⁾ A b k ü r z u n g: H.-M. = Handel-Mazzetti, Monogr. d. Gatt. *Taraxacum*, Leipzig und Wien 1907; detem. H.-M.