

Habitat in Hispania. L'osling.

Radix altero anno florens, Caulopedali, glaberrimo, paniculato, erecto, minus stricto: ramis virgatis. Folia primordialis, antequam caulem floriferum erigit, terma, oblonga; reliqua alterne subulata, canaliculata, glabra, carnosae, rectae. Flores racemosi. Calyces glabri Corollae flavae, palato glabro cum tinctura rubicunda in retuso gibbo palati.

malle.

30. ANTIRRHINUM corollis subcaudatis, calycibus lanceolatis pedunculatis, foliis subtomentosis ovatis (617. ante 25.)

Antirrhinum hispanicum villosum, origani folio. Ternum. inst. 168. glutinoso. Barr. ic. 598. mal.

Habitat in Hispania.

Facies Ant. majoris, a quo differt Caulibus prostratis, Foliis cauliculis oppositis. Herba tota villo vix conspicuo mollissima, calcari corollae magis protuberante; Pedunculis flore longioribus.

fenebralis.

10. CHEIRANTHUS foliis conferto-capitatis recurvatis undatis. (662. post. 4.)

Habitat - - - - -

Radix fibrosa. Caulis semipedalis infra flores, crassitie digiti, erectus, inferne nudus. Folia in capitulum dense congesta, lanceolata, obtusa, incana, sessilia, recurvata, undata. Racemi erecti, stricti. Flores purpurei & Siliquae tomentosa, curvatae ut in Ch. incano, cui maxime affinis, vix tamen varietatem dixerim.

legumini-
das.

34. HEDYSARUM foliis ternatis ovatis obtusis, spicis hirsutis. (749. post. 25.)

Habitat in China. Osbeck.

Folia ternata: foliolis ovatis, obtusis, nudis, minima seta terminatis. Spicæ ovatae, densae, hirsutissimae. Flores interstincti. Bracteis ovatis, subulato-acuminatis, longitudine florum. Pedicelli hirsuti. Calyces brevissimi, terminati setis tribus hirsutis. Corollae parvae. Legumina monosperma.

resedifolia.

9. SCORZONERA foliis pinnato-dentatis, caule ramulissimo subnudo divaricato (791. post. 6.)

Tragopogon, resedæ minoris folio, lupinum. Barr. ic. 800.

Habitat in Hispania. L'osling.