

rochers escarpés à 1800 mètres, juillet 1900, très rare et en quelques parts seulement. (H. H. et aliorum) (Arv.-Touv. in litt. novemb. 1903).

Hieracium amplexicaule L. VAR. *glutinosa* Arv.-Touv.
et Gaut. l. c.

Planta undiquè glanduloso-glutinosa, pilis simplicibus non hirsuta.

HAB. — Sierras del Pinar et de Cazorla, rochers ombragés entre 1600-1700 mètres, rare, juillet ; exsicc. n° 630 (1900) et Sierra de Maria.

C'est à cette variété qu'il faut rapporter l'*Hieracium Berardianum* Arv.-Touv. de la Sierra de Javalambre 1891, exsicc. n° 630, (Herv. Plant. Espag. in Bonnier, Revue gén. Bot. IV, p. 156 (1892) ; Willk. Suppl. p. 119.

Crepis oporinoides Boiss. VAR. *prostrata* Boiss. — Willk.
Lge, Prodr. II, p. 250. — Willk. Suppl. 118.

Cette variété très rare n'est citée que dans la Sierra Nevada (avec le type) et les Sierras de Baza et de Maria ; M. Reverchon l'a trouvée dans la Sierra de La Sagra, lieux arides à 1900 mètres, juillet, en quelques parts seulement (H. H.)

Crepis pygmæa L. VAR. *Granatensis* Willk. in Willk-Lge
Prod. II, p. 245 et Willk. Suppl. p. 116.

A typo differt : *foliis et praecipue anthodii squamis cano-tomentellis.*

Déjà citée par Willkomm au sommet de La Sagra, et retrouvée au même lieu en 1890 par Porta et Rigo (exsicc. n° 571), elle est à signaler encore dans la Sierra del Cuarto, rochers à 2.000 mètres, très rare et en quelques parts seulement, juillet (H. H.)

Scorzonera Reverchoni O. Debeaux. in litter. Octob.
1900, et exsicc. n° 1229, 1901.

Valdè distincta caule simplici, monocephalo, unico vel raro

duobus, fistuloso-tubæformi sub anthodio paulùm refracto striato, basi plus minusve tomentoso, supernè glabro ; foliis numerosis omnibus basilaribus, longè lineari-lanceolatis, suprà glabris, glaucis, subtús parùm floccoso-tomentosis, margine crispato undulatis integris vel laciniis linearibus remotisque munitis, caule multo brevioribus ; squamis anthodii exterioribus glabris lanceolatis parvis, interioribus duplo longioribus flores æquantibus ; ligulis fulvo-luteis ; acheniis basi attenuatis lævibus, rostro sulcato sulcis apice tuberculatis.

HABIT. — Sierra del Pinar, bois de pins, en quelques pieds seulement : juillet 1900. Sierra de Cazorla (prov. de Jaen) bois, à 1700 m. rare, juillet 1901, exsicc. n° 1229.

Phyteuma Charmeli Vill. — Willk. Lge, Prod. II, p. 285.

Cette plante des régions alpines et subalpines des Pyrénées et des montagnes de l'Aragon austral, paraît rare en Espagne ; elle a été récoltée en échantillons peu nombreux dans la Sierra de Maïmon, rochers escarpés à 1700 mètres où elle est rare, juillet (H. H.)

Jasione foliosa Cav. — Willk. Lge, Prodr. II, p. 285. — Willk. Suppl. p. 126.

Récolté dans la Sierra de La Sagra, rochers escarpés, très rare à 1900 mètres, août, exsicc. n° 554, et déjà publié en 1890 de La Sagra par MM. Rigo et Porta, on doit ajouter : Sierra de Maïmon, à 1700 mètres, rochers escarpés, juillet.

Jasminum fruticans L. var. *speciosum* O. Deb. et Reverch. in litt. et sched. sans n°.

Cette variété intéressante méritait d'être nommée, suivant les auteurs et ils la décrivent ainsi : « *A forma typica differt caulibus rectis, infernè nudis, in parte superiori ramosis, ramis brevibus adpressis, foliis latioribus, floribus plus duplo majoribus versús apices ramorum dispositis* ».

HABIT. — La Puebla de Don Fadrique, lieux arides à 1200 mètres, juin, 1900 (H. H.)