

- β ? *lanceolata*, foliis lanceolato-ovatis acutis. \mathcal{U} S. tomentosa Willd. sp. 3. p. 1498. Pappus dicitur capillaris scaber, et ideo (si deser. exacta) à generi fortè aliena.
- γ ? *linearis*, foliis linear-lanceolatis apice subcallosis obtusis velutino-tomentosis. \mathcal{U} in Oriente. Radix lignosa apice multiceps. Folia $\frac{1}{2}$ poll. longa, 2 lin. lata. Capitula lateralia pedicello suo longiora. Invol. squamis paucis, ext. dimidiò brevioribus. Pappus more Scorzonerae plomosus. (v. s.)

38. S. SERICEA (Auch. pl. exs. n. 3307), acaulis pluriceps, foliis radicalibus linearibus integerrimis strictis apice subcallosis utrinque adpresso sericeis, scapis folio vix longioribus sericeo-villosis 1-cephalis, invol. squamis glabris linearibus acuminatis. \mathcal{U} in excelsioribus montibus Cappadociae ad Euphratem legit cl. Aucher! Herba 3-pollic. Habitus ferè Gelasiae, sed pappi setæ basi plumosæ. Achænia glabra. (v. s. comm. à cl. inv.)

39. S. VELUTINA, tota tomento velutino cana, radice cylindracea, foliis radicalibus lanceolatis linearibus integerrimis acutis, caulis folio brevioribus simplicibus 1-cephalis basi folia 1-2 gerentibus, invol. squamis vix acutis erectis dorso lanato-canis. \mathcal{U} in Syria legit cl. Aucher pl. exs. n. 3312 ! An adhuc S. tomentosae var.? Pappus rufidulus basi plumosus. Cor. flavæ. Folia 2-3 poll. longa. Capitula duplo majora quam in S. tomentosæ var. γ . (v. s. comm. à cl. inv.)

40. S. FISTULOSA (Brot. fl. Ius. 1. p. 329), glabra, caule adscendente articulato fistuloso, foliis fistulosis cylindraceis apice subulatis, pedunculis apice subvillosis, invol. squamis subcarinatis. \mathcal{U} in humidis et graminosis Lusitaniae prov. Beira. Cor. stramineo-luteæ. Radix fibrosa repens. Achæn. et papp. indescrib.

b. *Foliis pinnatifidis.*

41. S. CORONOPIFOLIA (Desf. fl. atl. 2. p. 220. t. 44), pubescenti-subtomentosa, caule erecto subsimplici 1-cephalo basifolioso, foliis lanceolatis, aliis indivisis, plerisque rachi latâ pinnatifidis, lobis linearibus inæqualibus, invol. squamis mucronatis, exter. ovatis. \mathcal{U} in montibus Tunetanis (Vahl !) et Algeriensibus (Desf.), S. brevicaulis Vahl symb. 2. p. 88. t. 44. S. laciniata Vahl herb. Folia ferè Podospermi, sed invol. et fructus (immaturus eisdem) Scorzonerae. Cor. flavæ ad faucem barbatæ. (v. s. specim. à Vahl ad L'Hér. miss.)

42. S. CALVUSCENS, foliis ad collum confertis rigidulis pinnatipartitis, lobis rachique linearibus subcanaliculatis, junioribus tomentosis, adultis glabris, scapo 1-cephalo tomentoso foliis breviore, invol. squamis ovato-oblongis acutis, exterioribus tomentosis, inter. glabris. \mathcal{U} in insulâ Scio leger. cl. Olivier et Bruguieri. Herba vix 3-pollicaris. Flores latei. Fol. lobi 3-4-jugi, lobo terminali ceteris triplo longiore incurvo. (v. s.)

Sect. II. GELASIA. — Gelasia Cass. bull. phil. mart. 1818. dict. sc. nat. 18. p. 285. 42. p. 81. — Galasia Less. syn. 134.

Pappus inæqualis, setis ad medium usque plus minus scabris nec verè plumosis. Achænia glabra.

43. S. PYGMAEA (Sibth. fl. græc. t. 783. ined. ex Smith. prod. 2. p. 122), acaulis, scapo subnudo 1-cephalo longitudine foliorum aut paulo longiore, foliis linearibus acuminatis canaliculatis suprà sublanatis, invol. squamis acuminatis extùs pubescentibus \mathcal{U} in Olympi Bithynici cacumine (Sibth. Auch.!). Herba vix 3-pollicaris. Radix longa sublignosa ad collum multiceps. Cor. flavæ. Pappus scaber. (v. s. comm. à cl. Aucher sub n. 3308.)

44. S. RIGIDA (Auch. pl. exs. n. 3309), acaulis, foliis radicalibus linearibus integerrimis rigidulis utrinque tomento adpresso canis, scapis folia quadruplo superantibus nudis 1-cephalis, invol. squamis dorso subincanis linear-lanceolatis acuminatis margine subscariosis. \mathcal{U} in montibus excelsioribus Cappadociae ad Euphratem legit cl. Aucher! Folia 2 poll. longa, lineam lata. Cor. flavæ. Pappus scaber. (v. s. comm. à cl. inv.)