

oblongis acutis nervis sublongitudinal. notatis, invol. squamis acutis tomentoso-canescensibus. ♂ in montosis herbidis Persiae valle Kadschadara prov. Nakistchiwan et in montibus Seidschadschi prov. Aderbeischan legit cl. Szowitz! *Lasiospora latifolia* Fisch. et Mey.! ind sem. h. petr. 1835. p. 30. Affinis *S. ensifoliæ*, sed folia latiora brevius acuminata, pube brevi tomentosâ subsericeâ nec villis longis instructa. (v. s.)

53. *S. ERIOPHORA*, tota sericeo-lanata, caule 1-cephalo ad apicem usque paten-tim hirsutissimo foliis non longiore, foliis plerisque radicalibus linear-lanceolatis 5-nerviis, invol. squamis linearibus acuminatis ligulas adæquantibus. ♂ in Cappadociâ ad Euphratem detexit cl. Aucher pl. exs. n. 3347! Affinis *S. lanatæ*. *Lanugo* ferè *Hieracii eriophori*. Flores flavi. Achænia lanato-villosa. Herba 4-pollic. (v. s. comm. à cl. inv.)

54. *S. AUCHERTANA*, caule erecto ramoso striato, foliis linear-lanceolatis acumi-natis trinerviis margine lœvibus integerrimiis parcè subvelutinis, adultis glabris, capitulis longè pedicellatis, invol. squamis ligulas subæquantibus dorso sub-canescensibus. ♂ in Cappadociâ ad Euphratem legit cl. Aucher! *S. divaricata* Auch. pl. exs. n. 3315 non Turcz. Affinis *S. latifoliæ* sed glabrior, folia 3- nec 7-9-nervia, capitula dimidiò ferè minora. (v. s. comm. à cl. inv.)

55. *S. NERVOSA* (Trevir. ex linnæâ 1835. litt. p. 73), caulis erectis simplicibus polycephalis, foliis ventricoso-lanceolatis margine scabris multinerviis arach-noideis, achæniis lanatis. ♂ in Armeniâ. Cæt. ign. †.

Sect. IV. PENTACHLAMYS.

Invol. squamæ 5 uniseriales. Achænia glabra. Pappi setæ paucæ basi plumosæ apice aristæformes. — Species Indicæ. An genus proprium?

56. *S. BUPLEUROIDES* (Don prod. fl. nep. 162), caule erecto 1-cephalo glabro, foliis linear-lanceolatis acutis planis glabris basi villosis caule brevioribus, invol. 5-phyllo, pappo inæquali scabro. (I) in Nepaliæ montibus legit cl. Wallich. Radix fusiformis. Flores striati involucro breviores. An ex invol. 5-phyllo et pappo scabro vera Scorzonerae species?

57. *S. ROYLEI*, caulis è basi ramosis erectis glabris, ramis apice nudis 1-cepha-lis, foliis lanceolato-linearibus basi dilatata subvaginantibus margine villosis apice callosis glabris, invol. 5-phyllo, pappi setis basi plumosis apice nudis. — in Indiâ orient. legit cl. Royle. Species ab omnibus Europæis distinctissima. Affinis *S. bupleuroidei* videtur sed flores invol. per anthesin breviores demùm lon-giores, pappus verè plumosus et folia basi vaginantia (ferè ut in *Alopecuro*) et pallida satis distinguunt, saltem ex descr. Donianâ. (v. s. comm. à cl. Royle.)

Sect. V. POLYCLADA.

Capitula 6-8-flora. Invol. squamæ 6-8 pluriseriales. — Caules ramosissimi foliosi. Cor. flavæ.

58. *S. DIVARICATA* (Turcz. dec. p. 21. n. 23), glabra, radice suffrutescente, caulis ramosissimis divaricatis, foliis brevibus filiformibus apice uncinato-recar-vatis, capitulo paucifloro, invol. cylindrici cano-pubescentis squamis inter. 3-5, infer. totidem abbreviatis. ♂ in montosis lapidosis Mongoliæ Chinensis. Flores pauci lutescentes subtùs purpurascentes. Achænia glabra. Pappus basi plomo-sus. (v. s. comm. à cl. auct.)

59. *S. RAMOSISSIMA*, caule erecto ramosissimo, foliis linearibus glabris acumi-natis, capitulis longè pedicellatis nudis circ. 6-7-floris, invol. squamis acumi-natis ligulas æquantibus. ♂ in Oriente ad Elwend legit cl. Aucher! *S. eriosperma* Auch. pl. exs. n. 3330, sed differt ab eâ et ab omnibus ferè aliis capi-tulis 6-7- nec multifloris. Folia caulina circ. pollicem longa, 1-2 lin. lata. Cor. flavæ. (v. s. comm. à cl. inv.)

60. *S. VIRGATA*, internè sublanata, cæterùm glabra, caule ramosissimo, ramis virgatis, foliis sub origine ramorum linearibus elongatis acutis, capitulis pau-cifloris, invol. 6-7-phyllo glabro. ♂ in Indiâ bor. occid. legit cl. Royle! Affinis *S. divaricatae*, sed folia longiora apice non uncinata. (v. s. comm. à cl. inv.)