

ванія *C. Phrygia* L., *C. Austriaca* W. и близости къ нимъ *C. steptolepis* Kern., пока трудно опредѣлить распространеніе этого вида. Весьма возможно, что его уже находили на Кавказѣ, но подъ другимъ названіемъ.

C. Salonitana Vis. β . *subinermis* Boiss. Новороссійскъ.

C. diffusa Lam. Было находимо лишь въ немногихъ мѣстахъ: Ставрополь (Норм.) и полуостровъ Таманскій (Ледеб.); между тѣмъ, повидимому, довольно распространено на Сѣв. Кавказѣ: Новороссійскъ, станицы Абпнская, Багапская (Кубан. Обл.); Петровское (Ставроп.).

Psephellus hypoleucus (DC.). Верховья Кубани — Кардтжуртъ. На Кавказѣ найдено только въ одномъ мѣстѣ по р. Ардону (Терек. Обл.) Рупрехтомъ.

** *Crepis foetida* L. Грозный, Хасавъ-юртъ (Терек. Обл.); Петровскъ (Дагест.). До сихъ поръ вездѣ была находима лишь β . *rhaeadifolia* MB.; а между тѣмъ мои экземпляры представлятъ типическую *C. foetida* L. съ железистыми волосками на покрывалѣ.

** *Picris pauciflora* W. Новороссійскъ. За исключеніемъ довольно сомнительнаго указанія Лессинга для Сибири (Ledeb. Fl. Ross. II, 2, 800), это растеніе еще не было находимо въ предѣлахъ Россіи¹⁾.

** *Hieracium laevigatum* W. Два экземпляра изъ Тебердинскаго ущелья, совершенно соответствующіе рисунку Reichenbach'a (Ic. Germ. t. 163). Но видъ этотъ еще не былъ указанъ въ Россіи.

H. prenanthoides Vill. Тебердинское ущелье.

Scorzonera rubriseta sp. n.

Plus minus pubescens rhizomate verticali squamoso pluricipiti dense pulvinato cespitoso, caulibus plus minus elatis tenuibus (1—3), monocephalis vel 1—2 capitulis lateralibus stricte et longepedunculatis instructis folia radicalia subduplo superantibus; foliis gramineis anguste-linearibus, radicalibus elongatis basi in vaginulam rigidulam dilatatis, caulinis 2—3, capitulis parvis, involucri parce pubescentis calyculati phyllis externis parvis triangulari-lanceolatis acutis apice ciliatis, internis triplo vel quadruplo majoribus lineari-lanceolatis; flosculis luteis involucri quarta parte lon-

¹⁾ Найдено также I. Пачоскимъ въ Крыму.

gioribus, acheniis glabris striatis pappo rubello-fusco eis (junioribus) longiore superatis, setis inferne plumosis superne scabris.

Caule plus minus elato sub 10 -pollicari gracili, foliis longis, capitulis lateralibus (sub binis) sub 11 mm. longis longe pedunculatis instructo. Involucro subcalyculato inter affines insignis. Gunib (Daghestan).

[Sect. *Euscorzonera* DC., *pulvinares* Boiss.?]. Кажется, что, не смотря на сравнительно порядочный ростъ и присутствіе боковыхъ головокъ, этотъ видъ по характеру корня скорѣе нужно отнести къ группѣ *pulvinares* Boiss. секціи *Euscorzonera*. Растеніе это характерно своими весьма узкими листьями, небольшими головками съ подчасъемъ при основаніи и красновато-рыжими водосками летучки (что впрочемъ встрѣчается и у другихъ видовъ). Найдено на Гунибъ (Дагестанъ), съ цвѣтами и незрѣлыми съмянками въ половинѣ мая.

Scorzonera filifolia Boiss. Дженгутай (Дагестанъ). Видъ этотъ до сихъ поръ, кажется, только въ Дагестанѣ и былъ найденъ. Цв. въ половинѣ мая.

S. eriosperma MB. Видъ этотъ оказывается довольно распространеннымъ на Сѣв. Кавказѣ,—въ предгорьяхъ: Баталпашинскъ (Кубан.), Слѣпцовская, Хасавъ-юртъ (Терск.), Петровскъ (Дагест.).

** *S. parviflora* Jacq. Петровскъ (Дагест.), Караногайская степь (Терск.).

Lactuca Armena Boiss. (*L. stricta* W.K. β . *Armena* Boiss., Fl. Or. III, 808). Новороссійскъ; Мин.Воды (Терск.).

L. tuberosa (L. f.). Новороссійскъ.—Распростран.: Крымъ, Закавказ.

Cephalorrhynchus hispidus (MB.). Новороссійскъ. Растеніе это весьма рѣдкое; до сихъ поръ оно указано въ Закавказ. при р. Акстафа (также въ Персіи). См. Boiss. Fl. Or. III, 821.

Primula algida Adams. Гунибъ (Дагест.).

Gentiana Amarella L. Типичный экземпляръ изъ Тебердинскаго ущелья. У Boiss. Fl. Or. этотъ видъ совсѣмъ не показанъ для Кавказа (хотя у Ледебура приводится для г. Бештау, Fl. Ross. III, 1, 53).

** *Rindera tetraspis* Pall. Грозный (Терск.) у подножія Кабардинскаго хребта. Странно то, что это растеніе (въ сообществѣ съ другими, напр., *Cachrys odontalgica*) забралось даже въ предгорья.