

Примечание: Очень изменчиво; повидимому, распадается на несколько рас.

Род *Scorzonera* L.

Корзинки многоцветковые. Покрывала черепичатые. Цветоложе голое. Семянка линейно-цилиндрическая, кверху немного суженная, гранистая, при основании с углубленным рубчиком. Летучка из перистых, переплетающихся между собою неодинаковых волосков.

- 1. Семянки по всей длине густо волосистые 2.
- Семянки голые, иногда бугорчатые, но не волосистые 7.

2. Корневище цилиндрическое, на некоторой глубине клубнеобразно утолщенное, размер утолщения немного больше ореха. Листья сосредоточены у основания стебля, извилистые, линейно-ланцетные, вместе со стеблем и покрывалом густо бело-паутинисто-шерстистые. Корзинки одиночные, шир. 7—10 мм. Листочки их ланцетные, заостренные, наружные часто равны внутренним. Цветки желтые, снаружи красные, мало превышающие покрывало. Семянки обратно-конические, густо волосистые; хохолок рыжеватый, вчетверо длиннее семянки. Стебель 10—20 см. выс.—Сев.: Тер.: Гр.: Кут. (с) Тиф. (сю) Аз. Ган. (сю). На сухих склонах в средней горной зоне.

S. lanata M. B.

- Корневище цилиндрическое или веретеновидное, без утолщения. 3.
- 3. Листья широкие, ланцетные или широко-ланцетные . . . 4.
- Листья узко-линейные, 1—5 мм. шир. 5.

4. Прижато пушистое, серое, реже беловатое. Листья ланцетные, нижние сужены в черешок, стеблевые сидячие, к основанию слегка суженные, пяти-девятинервные. Корзинки продолговатые, 10—15 мм. шир. на б. или м. длинных ножках, на которых сидят немногие линейно-шиловидные листочки, образуют продолговатое соцветие. Листочки покрывала ланцетные, острые. Семянки цилиндрические, густо волосистые, хохолок рыжеватый, равен семянке. Стебли прямые, слабоветвистые, 40—60 см. выс.—Гр.: Тиф. (ю) Аз.: Карабах. Ар.: Эр. Нах. Тур.: Сурм. Ольт. В горной зоне, на сухих склонах.

S. nervosa Trev.

(=*S. latifolia* D. C.)

V. glabrata Trautv.—Растение серо-зеленое, мало пушистое.—Тур.: Сурм.

Все растение густо бело-войлочное. Листья более широкие, нижние ланцетные, сужены в черешок, стеблевые широко-ланцетные, при основании суженные. Соцветие почти щиткообразное, вследствие большой длины нижних цветоножек, усаженных ланцетными листьями, из которых верхние у самой корзинки. Корзинки продолговатые, 10—15 мм.

шир., густо бело-войлочное. Листочки покрывала линейные. Цветки желтые, немного длиннее покрывала. Семянки длинно и густо шерстистые, летучка рыжеватая. Стебли прямые, крепкие, 40—60 см. выс.—
Аз.: Карабах. (г. Зиарат). В верхней лесной зоне, на сухих местах.

S. pulchra Lom.

Примечание: Цикл форм, группирующихся вокруг *S. nevosa* нуждается в критической переработке. Здесь описывается особая узколистная *S. Safievi*; формы из Грузии также резко отличаются от азербайджанской *S. nevosa* и, повидимому, представляют особую расу.

5. Листья многонервные, линейные, иногда извилистые, длинные, серо-зеленые, плоские. Стебли прямые, выс. 50—60 см., многочисленны. Корзинки на длинных ножках, одиночные. Листочки покрывала серо-зеленые, узкие. Семянка цилиндрическая, густо пушистая с рыжеватым хохолком.—А р: Даралагёз. На сухих склонах в горно-степной зоне.

S. Safievi Grossh. (sp. nova)*

Листья 1—3-нервные. Растения более низкие 6.

6. Стебли слабые, при основании часто лежащие, потом приподнимающиеся, верхушки их до цветения поникшие, многочисленные, ветвистые, 20—50 см. выс.; основание стеблей покрыто войлочно-ресничатыми влагалищами. Листья линейные, неясно трехнервные, 1—3 мм. шир., слабые, часто извилистые. Корзинки обратно-конически-яйцевидные, 10—13 мм. шир. Листочки покрывала голые или ресничатые, ланцетные, острые. Цветки желтые, немного длиннее покрывала. Летучка рыжеватая, вдвое длиннее семянки.—Сев.: Тер. Даг. Абх. Гр.: Кут. (с) Тиф. (сю) Аз.: Ган. (сю) Бак. (с). На сухих склонах до средней горной зоны.

S. eriosperma M. B.

F. lanata Lipsky—Стебли, цветоножки и покрывала шерстистые.

Стебли торчащие, прутьевидные, прямые, из деревянистого основания многочисленные, 20—25 см. выс. Листья из основания стебля многочисленные, травянистые, бело-окаймленные, линейные, до 2 мм. шир., прижато седовато-пушистые. Корзинки на очень длинных ножках, обратно конические, 8—10 мм. шир. Листочки покрывала ланцетные, острые. Цветки желтые, мало превышают листочки покрывала. Летучка грязно-белая, равная семянке.—На х. На скалах, преимущественно известковых, в нижней и средней горных зонах.

S. ramossissima D. C.

V. pubescens Grossh.—Листочки покрывала мелко прижато-пушистые.

V. glabrescens Grossh.—Листочки покрывала голые.

- 7. Цветки розовые или красные. Подземные части клубневидно утолщены 8.
- Цветки желтые 10.

*) Устанавливаемые здесь новые виды собраны И. И. Карягиным и В. Сафиевым в Нахреспублике в 1931 году.