

Pag.

754, post **T. filifolium** insere :

T. gracile (Don in Mem. Wern. Soc. III, p. 407. — Hook. f. Fl. Brit. Ind. III, p. 417) perenne glabrum, radice superne pluricipiti, collo squamoso, scapo tenui sæpius unifloro inferne 1-2-phyllo folia radicalia anguste linearia acuminata tenera subæquante vel breviora, capitulo brevi paucifloro, involucri phyllis 5-8 lanceolatis basi puberulis cæterum glabris flosculos luteos extus rubellos æquantibus vel subbrevioribus, acheniis lævibus obsolete rostratis ♀.

Hab. in pinetis vallis Kuram Affghanicæ usque ad 14000' (Aitch. 83! 178!).

Affine *T. filifolio* et *T. erostri* a priore foliis flaccidis et acheniis lævibus, a posteriore foliis latioribus, caulibus monocephalis et involucri phyllis elongatis diversum. Achenia mihi non visa ex cl. J. D. Hooker descripsi.

Ar. Geogr. Regio Himalaica occidentalis et centralis.

762, **Scorzonera mollis**, adde :

♂. *Eubœa*. — Tota adpresse cana, caules abbreviati foliis angustis flexuosis breviores. Capitula cylindrica pauciflora varietatis γ. *stenocephalæ*.

Hab. in monte Delphi Eubœæ (Pichler!).

762, post **S. mollem** insere :

S. Schweinfurthii, tota pilis stellatis adpressissime cana, radice crassissimâ tuberosâ ovato-oblongâ, collo squamoso, foliis infimis brevioribus lineari-oblongis undulatis expansis incurvis cæteris linearibus flexuosis, scapis folia subsuperantibus, capitulis abbreviatis ovatis, involucri pube ramosâ puberuli phyllis paucis inæqualibus ovatis et late lanceolatis marginatis obtusis, flosculis involucri sublongioribus luteis marginalibus extus roseis, acheniis striatis omnibus transverse muricatis pappo fusciscente subæquilongis superatis ♀.

Hab. in planitie elatâ Galala deserti Arabici Ægypti mediæ (Schweinf. exs. 75!). Vulgo *Debbah*. Radix ut et tota planta ab Arabis comeditur.

A *S. molli* pro quâ cl. inventor eam habuit mihi differre videtur tubere multo crassiore tripollicari diam. bipollicari, indumento adpressiore stellato, foliis latioribus obtusis inferioribus dilatatis, capitulis brevioribus latioribus, acheniis omnibus valde muricatis. *S. Alexandrina* radice elongatâ in tubere parvum glabrum abeunte aliisque notis longius differt.

S. Troodea, pube adpressissimâ ramosâ araneoso-canescens, radice verticali elongatâ cylindricâ, foliis radicalibus oblongis mucronatis in petiolum brevem attenuatis, caulibus brevissimis basi ramosæ 2-3-cephalis et foliis anguste linearibus undulatis obsitis, pedunculis elongatis parce et breviter foliatis, capitulo cylindrico, involucri phyllis paucis glabris apice ciliatulis anguste membranaceis ab infimis ovatis ad interiora elliptica auctis obtusis, flosculis luteis extus purpurascensibus involucri sublongioribus, acheniis