

Географическое распространение (ar. geogr.): Восточное, Южное, Юго-Западное, Западное Закавказье. Восточная Анатолия (Армянский Курдистан).

Примечание. Вид *Scorzonera Seidlitzii* Boiss. хорошо выражен в своих морфологических признаках и занимает на Кавказе широкий ареал. Карта. 1.

Ряд (Series) 2. *Rigidiae* Lipsch. во Фл. СССР XXIX (1964) 75; Addenda XXVIII, 720.

Тип (typus): *Scorzonera rigida* Auch.

4. *Scorzonera rigida* Auch.

Auch. ex DC. Prodr. VII, 1(1838) 123; Boiss. Fl. Or. III (1875) 774; Гроссг. в Бот. сборн. Аз ГНИИ, I (1932) 54; он же Фл. Кавк. IV (1934) 240; Липш. Фрагм. моногр. *Scorzonera* 1 (1935) 30; Гроссг. Опред. раст. Кавк. (1949) 510; Исаев во Фл. Азерб. VIII (1961) 522; Липш. во Фл. СССР XXIX (1964) 75; Тахт. и Фед. Фл. Еревана (1972) 312; Chamberlain in Davis, Fl. Turkey 5 (1975) 651.

Ic.: Липш. l.c. 1935 табл. 9, 10: Phot. 1, 2.

Тип (typus): "In montibus excelsioribus Cappadociae ad Euphratem, legit cl. Aucher" (G.).

Географическое распространение (ar. geogr.): Южное Закавказье. Малая Азия (Восточная Анатолия). Карта 1.

Примечание. *S. rigida* Auch. является представителем ряда *Rigidiae* Lipsch. секции *Pulvinares* (Boiss.) Lipsch. Ареал этого вида на Кавказе ограничен, вид встречается только лишь в Южном Закавказье и приурочен, главным образом, к сухим, каменистым местообитаниям.

Секция (Sectio) II. *Angustifoliae* Kuthath. sect. nova

Стебли одиночные или многочисленные, ветвистые, густо или слабо олиственные. Листья прикорневые и стеблевые, ланцетные или линейно ланцетные, многонервные. Корзинки одиночные или многочисленные. Семянки голые или опушенные. Шетинки хохолка красно-бурые или белые.

Caules pauci vel numerosi ramosi, crebre vel sparse foliosi. Folia radicalia caulinaque lanceolata vel linearia, multinervosa. Calathidia solitaria vel numerosa. Achenia glabra vel pubescentia, pappus rubro-bruneus vel albus.

Тип (typus): *Scorzonera Koslovskyi* Sosn.

Ряд (Series) 3. *Koslovskiana* Lipsch. во Фл. СССР, XXIX (1964) 76; Addenda XXVIII, 720.

Тип (typus): тип секции.

5. *Scorzonera Koslovskyi* Sosn.

Сосновский в Гроссгейм Фл. Кавк. IV (1934) 241; Липш. Фрагм. моногр. *Scorzonera* I (1935) 42; он же во Фл. СССР XXIX (1964) 76; Кутателадзе в Опред. раст. Грузии II (1969) 179; она же в Зам. сист. геогр. раст. (Тбилиси) 28 (1970) 53. - S. debilis Sosn. в Тр. Тбил. бот. инст. II (1937) 222; Гроссг. Опред. раст. Кавк. (1949) 511; Папава во Фл. Грузии VIII (1952) 648.

Ic.: Липш. I.c. 1935, табл. 15.

Тип (typus): Prov. Tiflis, distr. Achalkalaki, in jugo Tetrob. 30.VIII.1930 W. Koslovsky (TBI!)

Изученные экземпляры: (*specimina examinata*): Джавахетия, Тетроби 15.IX.1931 Кецховели (TBI); Тетробо-Чобаретское лесничество Ахалкалакского района, ЮЗ Грузия у вершины южного склона Чобаретского хребта 7.VIII.1932 №403 Медведев (MW); Джавахетия на г. Тетроби 24.VII.1967 Лачашвили, Кутателадзе (TBI); Джавахетия на хребте Тетроби 19.VII.1969 Хинтибидзе (TBI); Бакурианский Ботанический сад (перенесен с хр. Тетроби) 1.VIII.1967 Григалашвили и Ш. Кутателадзе (TBI). Карта 2.

Географическое распространение (ar. geogr.): Юго-Западное Закавказье. Эндем.