

S. J. LIPSCHITZ

FRAGMENTA MONOGRAPHIAE  
GENERIS SCORZONERA

## 11. SECT. DIMORPHOPAPPOSA LIPSCH.

**Sect. Dimorphopapposa Lipsch. sect. nova, hoc loco.** *Achaenia alba costato-striata*, externa compressa ad costas muriculata pappo plumoso persistenti, interiora angulato-cylindrica laevia pappo scabro pauciseto fragili. Radix tuberosa.

Секция характеризуется диморфной летучкой. Семянки белые ребристо-бороздчатые, наружные сплюснутые, по ребрам мягко-игольчатые с перистой остающейся летучкой, внутренние угловато-цилиндрические гладкие с шероховатой ломкой малоцетинковой летучкой. Корень утолщен в клубень.

Всего 1 вид: *Scorzonera limnophila* Boiss.

**1. Scorzonera limnophila Boiss.** Diagnoses novarum plantarum orientali-um. Ser. I, n° 7 (1846) p. 7; Ej. Flora orientalis III (1875) p. 763, n° 13.

Голый маленький многолетник 3—7,5 см высоты с яйцевидным клубнем. Корневая шейка слегка одета чешуями. Листья все прикорневые, распластанные по земле, укороченно-линейные, до 4 см длины, 4 мм ширины, на верхушке туповатые, мозолевидные, по краю опоясаны узкой белой полоской. Стебли в виде стрелок, 5—7,5 см длины с мелкими одиночными листочками или без них, часто почти вдвое длиннее прикорневых листьев. Корзинка цилиндрическая 1,5—1,6 см длины [в период цветения], в период плодоношения до 2 см длины. Цветы желтые, наружные слегка красноватые [по Буассье]. Обертка голая: наружные листочки ее мелкие, яйцевидные, в три раза короче внутренних, внутренние линейные или эллиптические, все туповатые. Длина наружных листочков обертки 0,3—0,4 см, внутренних 1—1,4 см. Семянки белые ребристо-бороздчатые, наружные сплюснутые, по ребрам мягко-игольчатые с перистой остающейся летучкой; внутренние угловато-цилиндрические гладкие с шероховатой ломкой летучкой из малого количества щетинок.

**Примечание.** Я видел и анализировал лишь аутентичный экземпляр [см. ниже]. Буассье справедливо сравнивает этот вид с *Scorzonera inaequisara* [последняя относится к секции *Papposa*], но он резко отличен от представителей секции *Papposa* своей диморфной летучкой. Мезофильный, вероятно реликтовый вид.

**Тип вида:** «In paludosis prope fontem Tchesme Pias alpis Kuhdaëna Persiae australis. Th. Kotschy» [typus in Herbario Boissieri, cotyp. in Herb. Inst. Bot. Acad. Sci. Leninop.].

Экземпляр Kotschy имеет печатный гриф: «Th. Kotschy. Pl. Pers. austr. Ed. R. F. Hohenacker 1845, n° 737».

**Общее распространение.** Южный Иран, пока более нигде неизвестно.