

S. J. LIPSCHITZ

FRAGMENTA MONOGRAPHIAE  
GENERIS SCORZONERA

Без анатомического и морфолого-систематического изучения рода в целом неясно, является ли признак развития ножки на семянке признаком древним, остаточным или новым, прогрессивным.

В настоящий раздел нами включаются следующие виды:

- |                   |   |   |
|-------------------|---|---|
| Секция Incisa     | { | 1. <i>Scorzonera calyculata</i> Boiss.  |
|                   |   | 2. <i>Scorzonera incisa</i> DC.   |
|                   |   | 3. <i>Scorzonera libanotica</i> Boiss.  |
|                   |   | 4. <i>Scorzonera lacera</i> Boiss. et Bal.  |
|                   |   | 5. <i>Scorzonera bicolor</i> Freyn. et Sint. (= ? <i>Sc. Karjagini</i> Grossh.).  |
| Серия Brevicaulis | { | 1. <i>Scorzonera brevicaulis</i> Vahl. (= <i>Scorzonera coronopifolia</i> Desf.). |

Секция Incisa может быть диагностирована следующими признаками.

Растения с перисто-надрезными или перисто-рассеченными листьями. По надрезанности листья весьма варьируют, у ряда видов они по краю только  $\pm$  заостренно-зубчатые. Листья твердые или кожистые, часто сильно мучнисто-опушенные. Язычковые цветы желтые, розовые или фиолетовые; у ряда видов с двойной окраской, именно: язычки желтые, у перехода же язычка в трубку — черно-пурпуровые. Семянки без ножки. Семянки у разных видов варьируют: белые или телесного цвета, ребристые (иногда ребра опробковевшие), глубоко-бороздчатые, по ребрам с туповатыми зубцами (иногда краевые ребра заостренные, внутренние тупые), наружные семянки часто невыполненные, плоские, по краю  $\pm$  остро-зубчатые. У *Sc. lacera* Boiss. et Bal. семянки с поперечными рядами мягко-игольчатых пластиночек, у *Sc. calyculata* Boiss.; *Sc. bicolor* Freyn. et Sint.<sup>1</sup> пока неизвестны.

### Sect. Incisa Lipsh., sect. nov.

Folia distincte inciso-pinnatifida vel acute dentata, rigida vel coriacea, saepe farinosa. Flosculi flavi vel rosei vel violacei, interdum ligulis flavis fauce atropurpureis. Achenia basi non stipitata, alba vel pallide rosea, profunde sulcata, costata (interdum suberoso-costata), costis in dentibus obtusis instructis, interdum costis acheniorum marginalium acutiusculis interiorum obtusis. Achenia exteriora saepe compressa, marginibus  $\pm$  acuto dentatis. In *Sc. lacera* Boiss. et Bal. achenia costis transverse  $\pm$  crebre lamellato muricatis; in *Sc. calyculata* Boiss. et *Sc. bicolor* Freyn. et Sint. achenia ignota.

Виды этой секции географически приурочены к Передней Азии (Персия, Сирия, Турецкая Армения), заходя на Кавказ.

## 1. КЛЮЧ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ СЕКЦИИ INCISA И СЕРИИ BREVICAULIS

1. Корзинки крупные, 4,5—5 см длины и 15—20 мм ширины. Обертка войлочно-опушенная, позднее оголяющаяся, листочки ее по краю мозолевидно-утолщенные или окаймленные красной полоской, на верхушке сильно заостренные. Семянки крупные, 2 см длины, с расширенным, имитирующим ножку основанием, по ребрам негусто усажены бородавками. Растения Северной Африки . . . . .

(1) *Scorzonera brevicaulis* Vahl. (1791) [= *Scorzonera coronopifolia* Desf. (1800)].

\* Корзинки мельче, 2,5—4 (4,5) см длины и 8—12 (15) мм ширины. Обертка голая, листочки ее по краю не утолщены мозолевидно и не окаймлены красной полоской, на верхушке туповатые или слабо заостренные. Семянка без ножки, другой скульптуры. Растения Передней Азии . . . . . 2.

2. Листья ясно перисто-надрезные, стержень листа варьирует по ширине, боковые доли различные по форме и ширине, изогнутые, заостренные<sup>2</sup> . . . . 3.

<sup>1</sup> Хотя для *Scorzonera Karjagini*, которую я считаю равной *Sc. bicolor*, они известны и далее описываются.

<sup>2</sup> Виды *Sc. incisa* DC., *S. calyculata* Boiss. варьируют по надрезанности листьев, которые бывают по краю заостренно-зубчатыми или перисто-надрезанными. По этой причине в таблице они приводятся по двум ступеням