

involucro octophyllo, foliis supra basin transverse impressis; floribus involucro plerumque longioribus squamoso-muricatis Koch syn. *Fl. Germ. F.* 423.

T. orientalis Linn. sp. 1109. — Spreng. *syst. veg.* III. p. 662. — Ledeb. *fl. Alt.* IV. p. 157.

Tragopogon undulatus Reichenb *fl. excurs.* p. 277. (non Jacq.).

T. undulatum β . orientale DC. *prodr.* VII. p. I. p. 113.

Species mihi ex unico individuo deflorato, ab amic. S. Sczukin in regione Baicalensi, loco mihi ignoto, lecto tantummodo nota et forte propria. Distinguitur nempe a *Tr. orientali*, prope Krasnoyarsk, magna in copia crescente, involucri squamis longioribus atque achæniis irregulariter pentagonis ad costas tuberculis seu potius callis candidis obtusis obsitis. Glaberrimus, folia basi amplexicaulia, apice undulata. Corollæ ignotæ.

214. SCORZONERA DC. *fl. Franç. ed.* 3. p. 59. *prodr.* VII. p. I. p. 117.

Less. syn. 134. (excepta *Gelasia* Cass.) — *Endl. gen.* n. 2997. — *Scorzonera et Lasiospora* Cass. *Fisch. et Mey.* — *Scorzoneræ* spp. Linn. *Gærtn.* II. p. 367. t. CLIX. f. 1. Lam. *ill. t.* 647.

Capitulum multiflorum. Involucrum imbricatum. Receptaculum nudum, Achænium in rostrum brevissimum sensim attenuatum, callo basilari hilum cingente brevissimo. Pappus pluriserialis conformis plumosus, setis interdum (in *Scorz. macrosperma*) basi in anulum concretis et simul deciduis. Herbæ radice fusiformi aut tuberosa. Caulis simplex monocephalus aut ramosus ramis monocephalis. Flores purpurei

sesquies superantibus, foliisque angustioribus. Achænia glabra angulato-striata.

In montosis sylvaticis frequens. Floret Majo, Junio. 2.

Sectio II. PIPTOPOGON *C. A. Mey. in litt.*

Achænia elongata subincurva, subpuberula. Pappi paleæ in anulum deciduum basi concreta. An genus proprium? Habitus Tragopogonis.

694. SCORZONERA MACROSPERMA *DC.*

S. glabra, caule erecto tereti fistuloso folioso; foliis elongatis lanceolatis plurinerviis semiamplexicaulis integerrimis; capitulis corymbosis pedicellatis; involucri squamis exterioribus ovatis brevibus, interioribus lanceolatis elongatis DC. prodr. VII. p. I. p. 121.

S. macrosperma Turcz. pl. exsicc.

Piptopogon macrospermus C. A. Mey. in litt. — Turcz. cat. pl. Baic. Dah. n. 698.

In Dahuriæ herbosis prope Nerczinskoi Zawod et ad fluvios Schilka et Argun. Prope Irkutiam rarissima. Floret Junio 2. Flores flavi.

915. PICRIS *Juss. gen. 190.*

Gærtn. fr. II. p. 366. t. CLIX. f. 2. — Lam. ill. t. 648. — Schkuhr t. CCXVI. — Less. syn. 132. — DC. prodr. VII. p. I. p. 128. — Endl. gen. n. 2999. — Picris et Medikusia Mœnch Reichenb. — Picris et Spitzelia C. H. Schultz. — Picridis spp. Linn.

Capitulum multiflorum. Receptaculum nudum. In-
N^o III. 1848.